

헤미론 정

HEMIRON Tab.

K G M P

적격업체

일반의약품

분류번호: 117

【원료약품의 분량】 1정 중

히페리신80%메탄올건조엑스(KPC) 84mg
 승마추출액(KPC) 0.0364mL

【성상】 어두운 녹색의 원형 필름코팅정

【약리 작용 및 특징】

1. 헤미론정은 식물성 신경안정제인 히페리신 성분과 식물에서 추출한 에스트로겐 유사물질인 승마추출액의 복합제로서 두 성분의 상승작용으로, 폐경기에 나타나는 육체적 증상 및 정신적 증상을 효과적으로 치료합니다. 특히 황체자극호르몬 분비를 직접적으로 차단하기 때문에 발한, 홍조, 우울 등의 증상을 원인으로 차단해 줍니다.
2. 헤미론정은 생약 추출물로서, 국내외 임상실험결과 부작용이 경미하여 폐경 여성의 삶의 질을 효과적으로 향상시켜 줍니다. 또한 기존 호르몬요법에서 나타나는 질 출혈, 제증증가, 유방통 등의 부작용이 거의 없어 장기간의 치료를 요하는 폐경 증상 치료에 적합합니다.
3. 헤미론정은 기존 호르몬요법과 달리 유방조직이나 자궁내막에 대해서는 자극효과를 나타내지 않아 일반 폐경 여성은 물론 호르몬제 금기 환자도 안심하고 복용할 수 있습니다.
4. 헤미론정은 난소 적출술이나 자궁 적출술, 기타 여성 호르몬 이상에 기인되는 제반 증세를 지닌 여성에게 적용 가능하며, 호르몬 실조 증상을 보이는 젊은 여성에게까지 광범위하게 적용 될 수 있습니다. 특히 폐경기 환자의 경우에는 여타의 에스트로겐 복용환자에서 나타나는 생리유도 현상이 나타나지 않기 때문에 환자의 순응도가 더욱 높은 제제입니다.
5. 헤미론정은 복용하기 편리하고, 체내에서 빨리 흡수가 되도록 제제화시킨 제제입니다.

【효능·효과】

폐경기의 다음 증상

- 홍조, 발한, 의욕저하
- 의기소침, 정신적긴장, 신경과민, 집중력부족, 불면, 불안 또는 불쾌감 등의 자율신경장애
- 생리전의 불수의적(psychovegetative) 이상증상

【용법·용량】

1회 1정씩 1일 2회, 필요시 1회 2정씩 1일 2회 복용
 아침, 저녁 식사와 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 약의 성분에 과민한 환자
 - 2) 기저의 피부 광과민성 환자
 - 3) 임부 및 수유부(사용경험이 충분하지 않다)
2. 이상반응
 - 1) 햇빛에 대한 피부의 민감성이 증가하는 광과민 반응이 특히, 피부가 흰 사람에게서 유발될 가능성이 있다.
 - 2) 간독성 이상반응이 보고된 바 있으며, 간질환으로 의심되는 증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 드물게 피로, 불안, 위장관 장애가 나타날 수 있다.
3. 일반적인 주의
 - 1) 약을 투여하는 중에 간질환으로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위의 통증, 진한 노 등)이 나타날 때에는 이 약의 복용을 중단하고 즉시 의사와 상담하여야 한다.
 - 2) 이전에 간질환 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위해가 있었던 환자는 의사와의 상담 하에 복용하여야 한다.
4. 상호작용
 - 1) 약은 사이토크롬 P450 대사효소를 유도하므로, 이 효소에 의해 대사되는 다음 약품의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 따라서 다음 약품과의 병용은 가능하면 피하고 부득이하게 병용 시에는 부작용 발현 여부 및 아래 사항에 주의해야 한다.
 - 1) HIV 프로테아제 억제제(인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 네피나비르, 암프레나비르 등)등 항레트로바이러스제(에파비렌즈, 네비라핀, 데라비리딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 다디노신, 갈시타빈 등)과 병용시 이러한 항레트로바이러스제의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현될 수 있다.
 - 2) 쿠마린계 항응고제(헤파린, 와파린 등), 면역억제제(사이클로스포린, 타크롤리무스수화물 등), 강심제(디기톡신, 디곡신, 메칠디곡신 등), 기관지 확장제(아미노필린, 골린테오필린, 테오필린 등), 항부정맥제(아미오다론, 퀴닌, 디소피라미드, 프로파케논, 리도카인 등), 항건련제(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 등), 항우울제(이미프라민, 아마이트립틸린, 노르트립틸린 등), 항암제(사이클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에토포시드 등)과 병용시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요하다.
 - 3) 경구용 피임제(에치닐에스트라디올, 대소게스트렐, 노르에치스테론, 레보노르게스렐 등)와 병용시 경구용 피임제의 효능 감소 및 부정성기출혈의 발현율이 증가할 수 있다.
 - 4) 선택적세로토닌재흡수저해제 등 관련 항우울약(시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 세르tral린, 네파조론 등), 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용 시 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임부 및 수유부 투여에 관한 자료는 충분하지 않다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 3) 용어를 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【포장단위】 120정, 240정

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입하였을때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 작성일자(2008년 1월)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- * 제조판매인: 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 신정리 521-15

설명서개정년월 : 2008년 1월



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr