

【원료약품 및 그 분량】 1 정 중

*유효성분

메타규산알루미늄산마그네슘(KP)	40mg
탄산수소나트륨(KP)	50mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000(KP)	20mg
스코폴리아엑스(KP)	5mg
리파제 II(KP)	7.5mg
감초가루(KP)	25mg
침강탄산칼슘(KP)	100mg
트리메네틴탈레산염(KP)	50mg

*동물유래성분 : 유당수화물(소의 원유)

*기타첨가제 : 옥수수전분, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 탭, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜4000, 히드로멜로오스2910

*첨가제(타크로스) : 청색4호, 황색4호, 청색1호(레이크), 황색203호(레이크)

【성 상】 연두색의 타원형 필름코팅 정제

【효능 · 효과】 소화성 장애에 따른 다음 증상의 개선

: 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식대위체, 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량

【용법 · 용량】 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 투석요법을 받고 있는 환자

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 일반적 주의

1) 장기연용을 하지 않는다.

2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

3) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.

4) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 이 약으로 알레르기 증상(발진발적가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3) 신장에 환자

4) 간장에 환자

5) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 부작용

1) 이약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진발적가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계출혈현관대감통 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.

5) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.

5. 상호작용

위장진동 · 진경제와 병용투여하지 않는다.

6. 소아 · 임부에 대한 투여

1) 이 약은 소아(15세미만)에게는 투여하지 않는다.

2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

8. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자

2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자

3) 부종이 있는 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

9. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본제의 복용에 의해 노랑이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 제액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰혈청 칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

10. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프케이노배루로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이노제(테트라클로메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

11. 적용상의 주의

이 약은 황색4호(타르트트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알레르기 경력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10정/PTP, 10정/스트립, 20정/스트립, 180정/스트립

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【부작용보고】 한국의약품안전관리원(1644-6223)

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

■ 제품에 관한 기타 자세한 사항은 본사 054)552-5381~2으로 문의하시기 바랍니다.

■ 이 약의 허가사항은 약학정보원 홈페이지(www.health.kr)에서도 확인하실 수 있습니다.

설명서개정일자 : 2019.10.01