

구강내 청결과 관련되는 치아 주위의 통증에는 치조(齒槽)에서 농(膿)과 피가 흘러나 오거나 고름주머니 형성 또는 치아가 솟아오르기도 하며 적자색으로 부어오르고 근질근질한 느낌, 치아뿌리 노출과 입냄새 등을 동반하여 통증이 있는 치조농루 및 치아 주위의 치육연부의 염증이 생기어 통증을 호소하는 치은염 등을 흔히 볼 수 있다.

"덴티에프캡슐"은 치아 주위 조직의 혈액순환과 잇몸의 모세혈관을 강화해주는 비타민과 잇몸의 염증을 가라앉게하는 소염제 및 출혈방지제가 이상적으로 배합된 우수한 잇몸질환 치료제입니다.

[원료약품 및 분량] 1캡슐중

염화리소짐 ([달:달갈흰자] 식 약청 고시 제98-127호)	30mg(역가)
카르바조크롬(식약청 고시 제98-127호)	2mg
초산토코페롤 50% (식약청고시 제 2003-47호)	10mg (비타민E로서 5.01.U)
제피아스코르빈산(식약청고시 제2003-12호)	156.3mg (아스코르빈산으로서 150mg)

[성상] 주황색의 내용물이 든 상·하 암갈색의 경질캡슐제

[효능·효과] 치은염, 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여할것.

- (1)약 및 화장품 등으로 알레르기증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자.
- (2)다른 약물을 투여받고 있는 환자.
- (3)지금까지 이 약이나 달갈에 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람.

2. 부작용

- (1)이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
- (2)피부: 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘증후군(중독성 표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진, 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

3. 일반적 주의

- (1)정해진 용법 용량을 잘 지킨다.
- (2)1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.

4. 저장상의 주의사항

- (1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- (2)직사일광을 피하고, 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
- (3)오용을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 넣지 않는다.

[포장단위] 20캡슐, 150캡슐, 300캡슐

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

개정년월일 : 2006년 9월 18일

● 최신의 정보 확인방법 : 변경된 내용은 학술부(031-443-3922~3)에서 확인할 수 있음.

*의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

*본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.



제조발매원

크라운제약(주)

경기도 안양시 만안구 안양7동 218-7
학술부(031)443-3922~3, (02)754-4271