

# 제나콤 정

## (알벤다졸)

Brand of Albendazole

분류번호 : 642

【원료약품 및 그 분량】

1정 중

알벤다졸(미국약전) ..... 400밀리그램

## 【성상】

연한 오렌지색의 장방형 필름제피정

## 【효능·효과】

다음의 장내 기생충의 구제에 사용

요충, 회충, 십이지장충, 편충, 아메리카구충, 분선충

## 【용법·용량】

1. 성인 및 2세 이상 (생후 24개월 이상)의 소아는 아래의량을 투여  
요충, 회충, 십이지장충, 편충, 아메리카구충 : 1정 (400mg)을 1회 복용  
분선충 : 1정 (400mg)을 1일 1회 3일간 복용
2. 2세 이상 소아의 요충증 : 1일 1/2정 (200mg)을 1회 투여하고 7일 후 반복투여
3. 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요 없다.
4. 치료 3주후 검사를 하여 구제되지 않았다면 각 기생충의 경우에 따라 2차 투여 실시  
※ 2세 (생후 24개월) 미만의 소아에 대해서는 용법·용량이 아직 연구되어 있지 않다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 경고  
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 “아스파탐”은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것  
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인  
2) 2세 미만의 유소아
3. 이상반응  
1) 구토, 속쓰림, 설사 등의 위장관 장애 또는 두통증상이 나타날 수 있다.  
2) 스티븐슨-존슨 증후군, 다형홍반이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고, 이와 같은 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다.
4. 일반적 주의  
이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것
5. 수유부에 대한 투여  
모유로의 이행은 알려진 바 없으나 수유중의 안전성은 확인되지 않았으므로 수유부에게는 투여하지 말 것.
6. 보관 및 취급상의 주의사항  
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것  
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것
7. 기타  
드물게 발열, 전신발적, 가려움증이 나타났다는 보고가 있다.

## 【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

## 【포장단위】

2정

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부분서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인 하실 수 있습니다.

※의약품을 사용하기 전에 첨부분서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조·판매원



명문제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 901-1

www.mmp pharm.co.kr

〈설명서작성년월:05. 6〉

〈설명서작성년월:06. 6〉

〈M02〉