

【원료약품 및 그 분량】 1정중

L-시스테인(KPC)	40.0mg
90%아스코르브산과립(별규)	55.56mg
판토텐산칼슘(KP)	4.0mg

【성 상】 백색의 원형 당의정

【효능 · 효과】

습진, 여드름, 두드러기, 피부발진, 기미, 주근깨,
햇볕에 탄 피부 등의 색소 침착증, 약물에 의한 피부염
전신권태

【용법 · 용량】

- 성인 (15세이상) : 1회 2정
(7세이상~15세미만) : 1회 1정, 1일 3회
복용합니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

제조번호 :

사용기한 :

KMS 111008

벨라더마화이트정

1,000정



개량신약기술로 앞서가는기업
케이엠에스제약(주)
경기도 수원시 영통구 매탄3동 492-1

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약물을 복용하지 마십시오.
중증 신장에 및 간성흔수 환자.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오.
시스틴뇨증인 경우에는 신중히 투여 하십시오.
- 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하
십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 하십시오.
1) 드물게 설사, 구갈, 가벼운 복통 등의 증상이 나타날 경우.
2) 이 약의 복용에 따라 발진, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 경우.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항.
1) 정해진 용법, 용량을 지키십시오.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시키십시오.
(6세 이하의 어린이에게는 투여하지 않습니다.)
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4) 이 약의 복용에 의해 뇨 및 대변검사치가 영향을 받는 경우, 의사의 검사를 받을 때
비타민C를 복용하고 있음을 의사에게 알려십시오.
5) 이 약을 물 묻은 손으로 만지지 마십시오.(물 묻은 손으로 만질 경우 당의가 변색할
수 있습니다.)
6) 병 속의 패킹은 수송 중에 정제의 파손을 방지하기 위한 것이므로 개봉 후에는 제
거 하십시오.(병 포장 제품 중 패킹이 있는 경우에 한합니다.)
- 저장상의 주의 사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 뭄 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀봉하여)보관하십시오.
3) 오용을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.
4) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 마십시오.

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과
되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여
교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명문안을 주의깊게 읽으시고 설명문
안을 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.kmspharm.com>)에서 확인 할 수 있습니다.



분리배출

