

※ 의약품용 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품용 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

관절통 / 요통 / 건통 / 근육통 / 신경통

하이콘드로 정

HI CHONDRO Tab

일반의약품

분류번호 : 기타의 비타민제(03190)

[제품명] 하이콘드로 정

[원료약품의 분량] 1정 중

- 푸르셀티아민염산염(KP) 16.66 mg
(푸르셀티아민으로서 15.3 mg)
- 피리독신염산염(KP) 3.33 mg
- 시아노코발라민(KP) 10.0 µg
- 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 100.0 mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
- 동물유래성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)

[성 상] 미황색의 원형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통·건통(어깨결림) 등), 각기, 눈의 피로
2. 다음 경우의 비타민B, B6의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하

[용법·용량] 성인(15세이상) : 1회 2정, 1일 3회 복용 ※ 15세 미만 : 복용금지

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
1) 1세 미만의 영아(갓난아기) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 합니다.
- 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염) - 어지러움, 얼굴·다리 종창(부기)
2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 상호작용
1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께복용)투여하지 않는다.
- 레보도파
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[포장단위] 자사 포장단위

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 : 02-2206-3800에서 확인 할 수 있음.

※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고 의약품용어설명 및 정보는 "온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조"