

그린노즈®

시럽

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

일반적으로 코감기 초기에는 비인두 점막의 건조감, 이상감, 재채기 등을 시작으로 콧물 및 눈의 가려움, 눈물 등의 증상이 나타납니다. 그린노즈시럽은 콧물, 코막힘, 재채기 등에 유효한 항히스타민제에 비점막충혈제거제가 처방되어 신속한 치료작용을 가지며, 특히 기존 시럽제와는 달리 첨가제로 백당 대신 자일리톨로 제조한 새로운 개념의 어린이 코감기 시럽제입니다.(특허출원)

[원료약품의 분량] 100mL 중

염산슈도에페드린(USP)	600mg
염산트리프롤리딘(USP)	25mg
첨가제(보존제):벤조산나트륨(약전)	0.1g

[성상] 갈색 유리병에 담긴 무색의 딸기향이 있는 시럽제입니다.

※ 소아용안전용기 (Child-Resistant Closure):뚜껑을 누른 상태에서 시계반대방향으로 돌려주세요.

[효능 · 효과]

코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염[코염]에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘

[용법 · 용량]

- 성인 및 12세 이상의 소아:1회 10ml
- 소아:1회 6~12세 5ml, 2~5세 2.5ml
- 1일 3회 식사후에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증[심한 증상]의 간 및 신기능 장애 환자
- 3) 중증[심한 증상]의 관상 심장 질환 환자
- 4) 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨장애 환자
- 5) 고혈압 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 2세 이하의 영아[갓난 아기]
- 8) MAO 저해제를 투여중인 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 천식 환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 고혈압 및 관상동맥질환 환자
- 4) 심질환 및 부정맥 환자
- 5) 당뇨병, 갑상선기능항진증 환자
- 6) 전립선[전립샘]비대로 인한 배뇨곤란 환자
- 7) 7세 이하의 소아

3. 부작용

- 1) 중추신경계 : 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한[땀이 남], 경미한 혈압강하, 시력장애, 산동[동공 확대], 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직[굳음], 아테토시스, 간대성 및 간직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비가 나타날 수 있습니다.
- 2) 과민증 : 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계 : 구갈[목마름], 구역, 구토가 나타날 수 있습니다.
- 4) 비뇨기계 : 배뇨곤란이 나타날 수 있습니다.
- 5) 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 투여중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의하십시오.

2) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용[계속 복용]전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

3) 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 복용하되 용법 · 용량을 잘 지키고 표시된 연령[나이] 이외의 소아에게는 투여하지 않습니다.

4) 이 약은 벤조산나트륨을 포함하고 있으며, 벤조산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다.

5. 상호작용

혈압강하제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO저해제, 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸리움 베타나이드, 데브로소린, 메칠도파, 교감신경성약(충혈제거제, 식욕 억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제[억제제]와 병용[함께 복용]투여하지 않습니다. MAO저해제[억제제]의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제[억제제] 투여 최소 15일후 이 약을 투여합니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 안전성이 확립되지 않았으므로 투여 하지 않습니다.
- 2) 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않습니다.

7. 소아에 대한 투여

소아에서 특히 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 주의하십시오.

8. 과량투여시의 처치

과량투여시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용합니다. 슈도에페드린 제거에는 투석하도록 합니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관하십시오.
- 3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 차광 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 90, 100, 500ml (보형용:500, 1000ml)

※ 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 약국, 병 · 의원, 도매상에 한하여 각 영업소에서 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자(2010년 4월 26일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자

녹 십 자

GREEN CROSS

충북 음성군 금왕읍 내송리 156-50 TEL.031260-6300

소비자 상담실 TEL.080-260-0033