

메디콜



새로운 공법으로 효과빠른 종합감기약


[원료약품의 분량] 1캡슐(1,010mg) 중

구아이페네신(KP).....	80.00mg
클로르페니라민말레산염(KP).....	2.50mg
카페인우수물(KP).....	30.00mg
di-메틸에페드린염산염(KP).....	20.00mg
아세트아미노펜(KP).....	300.00mg
첨가제(타르색소): 적색40호	

[성 상] 백색 또는 옅은 적색의 내용물이 충전된 적색의 장방형 연질캡슐제

[효능·효과] 감기의 제증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 3회, 식후 30분에 복용한다.



본 제품은 어린이 보호용 안전포장을 사용하고 있습니다.
복용시,

- ① 가위 등으로 절취선을 따라 자르십시오.
- ② 접착이 안된 화살표부분을 잡고 화살표 방향으로 떼어 낸 후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
2. 다음 사람은 복용하지 말 것.
 - 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
 - 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
3. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 2) 지금까지 약에 의한 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 어린이(14세 이하)
 - 4) 간장, 신장, 감상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
 - 5) 심장에 장애가 있는 사람, 또는 고령자
 - 6) 녹내장에, 눈의 통증, 눈이 침침할 등이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
 - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
4. 복용할 때 다음 사항에 주의할 것.
 - 1) 용법, 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 다음 약제와는 동시에 복용하지 말 것. 진해거담약, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제등
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
 - 4) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고, 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
 - 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난

경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.

- 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
- 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항에 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.
- 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 4) 장기연용하지 말 것.

6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 가능한 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

■본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.

■본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

■의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

■설명서 작성일자(2009년 8월) 이후 변경된 내용은 이자트랙(<http://ezdrug.kda.go.kr/kda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

■소비자 상담실 : 02 - 568 - 0051

■반품 및 교환처 : 02 - 930 - 7085

설명서 작성일 : 2009. 08
P0907-01



알엔피코리아(주)

경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6