

인스핀

인스 위틴정은 강력한 위산분비 억제작용이 있는 히스타민(H₂)수용체 길항제(억제제)인 라니티딘염산염과 위산을 중화시키는 작용을 하는 3가지 종류의 제산제가 이상적으로 처방되어 위산으로 인한 속쓰림, 위통, 구역, 소화불량등의 증상등 각종 위장질환에 효과적인 위장치료제입니다.

【원료약품의 분량】 1정중

라니티딘염산염(라니티딘으로서 28.227mg)(USP)	31.5mg
산화마그네슘(KP)	50.0mg
규산알루미늄산마그네슘(NF)	125.0mg
수산화알루미늄산마그네슘(KPC)	100.0mg

【성상】 흰색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법·용량】 성인(15세 이상, 80세 미만): 1회 2정씩 복용하되 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용한다. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 투석요법을 받고 있는 환자 2) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장·간장 질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다. 위·십이지장 질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있다.) 3) 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 이질계 항진균제(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있다.) 4) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액 이상의 병력이 있는 환자 : 혈구수의 감소가 증가될 수 있다. 5) 히스타민 H₂·수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람 6) 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상): 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적다), 80세 이상의 고령자(노인)에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현(나타남)될 수 있다. 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의할 것. 8) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당·갈락토오스 흡수장애(glucose·galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약효상호작용에 의해 부작용의 발현(나타남) 및 효과의 감소가 나타날 수 있다. 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람 3) 고령자(노인)(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여한다. 4) 인후(목구멍)통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소등의 혈액 이상이 인정될 수 있다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있다. 5) 월인불령의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다. 6) 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다. 7) 장기연용계속 복용(사용)을 하지 않는다. 8) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

3. 부작용

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(나타남)될 수 있다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의 할 것. 1) 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)),변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있다.) 2) 이 약의 복용 후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되거나 손발이 차가워지며, 식은땀, 속앓이 등이 나타나는 경우가 있다. 3) 고열을 동반한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 열에 의한 물질 등 심한 증상이 전신(온몸)피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 땀겨울의 출혈, 비출혈(코피) 등이 나타나는 경우 5) 황달

4. 일반적인 주의

1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. 2) 2주간을 초과하여 연용(계속 복용(사용))하지 말 것. 3) 이 약을 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 말 것. (혈중 알콜농도를 높일 수 있다.) 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. 5) 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 말 것.

5. 상호작용

1) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있다. : 테트라사이클린계 항생물질(테트라 사이클린 등), 뉴클로논계 항균제(오폴록사신 등) 2) 이 약을 다른 위장약과 병용(함께 복용(사용))하면 작용이 강하게 발현(나타남)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여 한 경우에는 수유하지 않도록 주의한다.

7. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.)

8. 고령자에 대한 투여(65세 이상)

80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여한다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선이나 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 【문서작성일】 2012.03.26

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하십시오.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.