

HEALTHFUL LIFE + BEAUTIFUL LIFE
MEDICA KOREA

칼슘 · 비타민 복합제

칼디스트®

CALDIST Tab.

분류번호 : 321



⑩ 저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들여 있습니다.

[성분 · 함량] 1정 중

구연산칼슘(USP) 710mg

(칼슘으로서 149.7mg)

콜레칼시페롤 과립(KPC) 2mg

(비타민 D로서 200IU)

[성 상] 흰색의 장방형 정제

[효능 · 효과]

1. 칼슘결핍 및 칼슘의 보급
2. 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
3. 다음 경우의 비타민D의 보급
(1) 임신 · 수유기 (2) 발육기 (3) 노년기

[용법 · 용량]

12세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1정을 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 12개월 미만의 영아
 - 4) 신결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 강심배당체를 투여 중인 환자
3. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부기등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 상호작용
 - 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.
- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 임부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여
비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 · 훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다

※ 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.co.kr)를 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 마케팅부((02)2025-0217) 또는 개발부((02)2025-0213~5)로 문의바랍니다.

작성일자 : 2006.07.19

MK0607191

(주)메디카 코리아

경기도 화성시 향남면 상신리 904-6