

28310M10607 한국약품연구원 KGMP	 혈소판응집억제제 프라빅정 (황산수소클로피도그렐)	전문의약품 분류번호: 218
--	---	---

프라빅정은 클로피도그렐을 주성분으로 하는 thienopyridine 혈소판응집억제제로서 뇌졸중, 심근경색, 말초동맥성 질환이 있는 환자의 죽상동맥경화성 증상 개선에 사용할 수 있습니다.

- 【성분·함량】**
황산수소클로피도그렐(Clopidogrel Bisulfate)(유.에스.피.) 97.875mg
(클로피도그렐로서 75mg)
- 【성상】**
분홍색의 원형 필름코팅정
- 【약리 작용】**
1. 클로피도그렐은 경구투여 후 1세대사를 통해 활성대사체가 되어 ADP 수용체를 변형시킴으로써, ADP가 ADP수용체와 결합하는 것을 방해하여 혈소판 응집을 억제합니다.
2. 클로피도그렐은 ADP에 의해 일어나는 피브리노겐과 GPIIb/IIIa복합체의 결합을 억제하며, ADP에 의해 유도되는 혈소판응집 증폭작용을 억제합니다.
3. 클로피도그렐은 ADP 수용체를 비가역적으로 변형시킴으로써 결합한 혈소판의 생존기간(7일) 동안 혈소판응집 효과를 나타냅니다.

【특징】

- 프라빅정은 음식물의 섭취와 상관 없이 1일 1회 1정(75mg) 복용으로 복용이순응도가 우수합니다.
- 프라빅정은 동일 thienopyridine 혈소판응집억제제인 ticlopidine과 동일한 효과를 나타내는 반면, 안전성은 더 우수한 것으로 평가되었습니다.
- 프라빅정은 신기는 손상한자나 다른 환자에서 용량조절이 필요 없습니다.
- 프라빅정은 대조약과의 생물학적 동등성을 입증 받았습니다.

【효능·효과】

- 뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성질환이 있는 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선
- 급성 관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색)이 있는 환자에게 투여 시, 급성 관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색)이 있는 환자에게 투여 시, 약 300mg을 초기 투여하고 이후에 1일 1회 1정(75mg)을 음식물의 섭취와 상관없이 유지 용량으로 투여하십시오. 이 때, 아스피린 75~325mg을 1일 1회 이 약과 병용 투여하여야 합니다. 고려자 또는 신질환 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않습니다.

【용법·용량】

- 뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성질환이 있는 환자에게 투여 시: 음식물의 섭취와 상관 없이 1일 1회 1정(75mg)을 투여하십시오.
- 급성 관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색)이 있는 환자에게 투여 시: 약 300mg을 초기 투여하고 이후에 1일 1회 1정(75mg)을 음식물의 섭취와 상관없이 유지 용량으로 투여하십시오. 이 때, 아스피린 75~325mg을 1일 1회 이 약과 병용 투여하여야 합니다. 고려자 또는 신질환 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않습니다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 이 약을 단독으로 또는 아스피린과 병용하여 투여시 출혈이 멈추는 데 걸리는 시간이 보통의 경우보다 오래 소요될 수 있음을 환자에게 알려주고, 출혈이상(출혈부위 또는 지속시간)이 발생할 경 우 즉시 의사에게 보고하도록 지도하십시오. 환자는 수술 계획 전 또는 새로운 약물을 복용하기 전에 이 약을 복용하고 있음을 의사와 치과 의사에게 알려야 합니다.
 - 혈전성 혈소판감소성 자반종(TTP): 이 약 사용 후에 드물게 TTP가 보고되었으며, 때때로 단기간 사용(2주 이내) 후에도 보고되었습니다. TTP는 즉시 혈장분리반응물(혈장교란반)과 같은 치료 를 요하는 잠재적으로 치명적일 수 있는 증종의 상태로, 혈소판감소증, 미소혈관 용혈성 빈혈(분열적혈구[절단된 적혈구]가 미세도말표본에서 관찰), 신경학적 소견, 신부전 및 발열을 특징적 으로 나타냅니다. 임상시험에서, 이 약을 복용하는 17,500명 이상의 환자에서서 TTP는 나타나지 않았으나, 전세계적인 시판 후 사용에 의하여 이 약을 투여받은 적이 있는 환자 백만 명 당 약 4 건의 비율 또는 백만 인년(1만 단위 당 약 11건의 비율로 보고되었습니다. 한편, 이 질환(TTP)의 기저발생률은 백만 인년(人年) 단위 당 약 4건으로 추정됩니다.
 - 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 또는 이 약의 구성 성분과 과민증이 있는 환자
 - 투약 당시 소화성궤양 또는 두개내 출혈과 같은 병적인 출혈이 있는 환자
 - 중증의 간 손상 환자
 - 수술부
 - 선천적으로 갈락토오스 불내증, 락타아제 결핍증, 포도당-갈락토오스 흡수장애가 있는 환자(유당 함유제에 한함)
- 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
 - 위장관 출혈 환자
 - 이 약은 출혈시간을 연장합니다. 대규모 임상시험인 CAPRIE에서, 아스피린에 의한 위장관 출혈률이 2.7%인 반면, 이 약에 의한 위장관 출혈률은 2.0%였습니다. CURE 연구에서, 위약과 아스피린을 투여한 환자군에서 주요한 위장관 출혈률이 0.7%인 반면, 이 약과 아스피린 투여군에서는 1.3%로 나타났습니다.
 - 출혈 경향성(위장 병변(궤양 등)이 있는 환자 및 출혈 위험이 증가한 환자
 - 이 약은 출혈 시간을 연장시키므로 출혈이 생길 수 있는 병변을 가진 환자(특히, 위장관 및 인후내 병변)에게는 주의하여 투여하여야 합니다. 또한 다른 항혈소판제와 마찬가지로, 이 약은 위상, 수술 또는 다른 병리상태 등으로 인해 출혈 위험이 증가한 환자에게는 신중하게 투여하여야 합니다. 환자가 수술을 받기로 예정되어 있으며, 항혈소판 효과가 바람직하지 않은 경우에는 수술 5일 전부터 7일전에 이 약의 투여를 중단하여야 합니다. 이 약을 복용하는 환자는 위장관내 병변을 야기할 수 있는 약물(아스피린과 그 외 비스테로이드 소염제(NSAIDs), 헤파린, 당단백 Ilb/IIIa 저해제 또는 혈관용해제 등과 병용시 주의하여야 합니다. 특히, 투여 첫째 주 및/또는 집중성 임상 처치 또는 수술 이후에 잠재출혈을 포함한 환자를 주의해서 관찰하여야 합니다. 허혈성 사건의 재발 위험이 높은 노인성 허혈발작 또는 뇌졸중 환자일 경우, 이 약물 아스피린과 병용하였을 때 주요한 출혈이 증가하는 것으로 나타났습니다. 그러므로 이러한 환자에 있어 병용투여의 유익성이 확실성이 확립될 경우 신중하게 고려하여야 합니다. (심상작용 항 참조)
 - 간기능 손상 환자
 - 출혈성 소인이 있는 증종의 간질환 환자에게는 이 약의 사용 경험이 제한적입니다. 이런 환자에게 이 약은 신중하게 투여하여야 합니다.
 - 신기는 손상 환자
 - 신부전 환자에 대한 이 약의 사용 경험이 제한적으로, 이런 환자에게 이 약은 신중하게 투여하여야 합니다.
 - 급성 뇌졸중 환자(7일 이내)
 - 급성 뇌졸중 환자에 대한 관련자료가 부족하므로 권장되지 않습니다.
 - 이상반응
 - 이 약의 안전성은 이 약을 1년 이상을 투여한 9,000명용 포함한 42,000명 이상의 환자를 대상으로 평가되었습니다. 이 약의 전반적인 내약성은 연령, 성별, 인종과 관계없이 아스피린과 비슷하였 습니다. 이상반응 비율로써를 중단한 환자는 대략 아스피린과 같은 빈도(13%)였습니다. CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT 연구에서 관찰된 임상작용으로 중요한 이상반응은 아래와 같습니다.
 - 출혈경색
 - CAPRIE 연구에서, 이 약과 아스피린 투여군에서 전반적인 출혈의 발생빈도는 동일했으며(0.3%), 증종의 출혈 발생빈도는 이 약 투여 군에서 1.4%, 아스피린 투여군에서 1.6%로 각각 나타났 습니다. 구체적으로 살펴보면, 전반적인 위장관 출혈률은 이 약 투여군에서 2.0%였으며, 아스피린 투여군에서는 2.7%였습니다. 위장관 출혈률은 2.7% 이었고 임종이 필요치 않은 경우는 1.1%였습니다. 그 외에 위장 출혈의 발생빈도는 이 약 투여군에서 7.3%로서, 아스피린(6.5%)의 경우보다 높았습니다. 그러나, 이 중에서 증종의 출혈 발생빈도는 두 치료군에 유사한 것으로 나타났사(2.0 대 0.4). 또한, 자반/자승/혈종(purpura/bruising/haematoma)과 비출혈(epistaxis)이 가장 빈번하게 발생되었으며, 혈종, 혈노, 안구내출혈(주로 맥락막 부위)은 덜 빈번하게 보고되었습니다. 두께내 출혈률들은 아스피린의 경우 0.5%이고 이 약은 0.4%였습니다.
 - CURE 연구에서 위약과 아스피린을 투여받은 환자군에서보다 이약과 아스피린을 병용투여한 환자군에서 주요한 출혈 및 경간의 출혈이 증가되었습니다.(주요한 출혈의 발생빈도 2.7% 대 3.7%, 경간한 출혈의 발생빈도 2.4% 대 5.1%). 주요한 출혈이 주로 발생되는 위치는 위장관계 및 천자(puncture) 부위 등이었습니다. 위약과 아스피린을 투여받은 환자군과 비교하여 이 약과 아 스피린을 병용투여 받은 환자군에서 생명을 위협하는 출혈의 발생빈도 증가는 통계적으로 유의하지 않았습니다(1.8% 대 2.2%). 두 치료군에서 치명적인 출혈의 발생빈도는 차이가 없었습니다(두 군 모두 0.2%). 생명을 위협하지 않는 주요한 출혈의 발생빈도는 위약과 아스피린 투여군에 비해 이 약과 아스피린 투여군에서 유의하게 높았고(1.0% 대 1.6%), 두 치료군에서 두개내 출혈 률은 0.1%로 동일하였습니다. CURE 연구에서, 이 약과 아스피린의 병용투여군에서의 출혈률은 아래의 표와 같습니다.(%)
 - 적당한 다른 표준요법제가 치료중 사용되었습니다.
 - 위장관 출혈
 - 위장관 출혈은 위장관 출혈에 대한 주요한 출혈 증상인 aspirin에 대해 용량 비례적이었습니다.
 - ($<100\text{mg} = 2.6\%$; $100\sim200\text{mg} = 3.5\%$; $200\text{mg} = 4.9\%$)
 - 위 약 + aspirin에 의한 주요한 출혈 증상의 발생률은 aspirin에 대해 용량 비례적이었습니다.
 - ($<100\text{mg} = 2.0\%$; $100\sim200\text{mg} = 2.3\%$; $200\text{mg} = 4.0\%$)
 - 이로 인해, 약물의 투여가 중지되었습니다.
 - CURE 연구에서, 대상 환자의 92%가 헤파린 및 저분자량 헤파린을 투여받았으며 이 들 환자의 출혈률은 이 약의 전반적인 결과와 유사하였습니다. 최소한 수술 5일 전부 터 이 약의 투여를 중단한 환자에서서 관상동맥회로우회술 이후 7일 이내에 주요한 출혈이 추가로 관찰되지 않았습니다(이 약과 아스피린 투여군에서 4.4%, 위약과 아스피린 투여군에서 5.3%). 관상동맥회로우회술 이전 5일 이내에 이 약을 투여 받은 환자군에서, 출혈성 증상의 발현률은 이 약과 아스피린 투여군에서 9.6%, 위약과 아스피린 투여군에서 6.3%였습니다.
 - CLARITY연구에서 주요한 출혈(두개내 출혈 또는 헤모글로빈이 5g/dL 이상 감소 하는 것과 관련된 출혈)의 발생은 두 투여군에서 유사하게 나타났습니다(이약+아스피린 vs 위약+아스피린)
 - COMMIT연구에서 출혈이 발생한 환자수(%)는 다음과 같습니다.

증상	클로피도그렐(+ aspirin) ^(a) (n=6,259)	위 약(+ aspirin) ^(b) (n=6,303)	P-value
주요한 출혈	3.7% ^(a)	2.7% ^{(a)(b)}	0.001
• 생명을 위협하는 출혈	2.2	1.8	0.13
• 치명적	0.2	0.2	
- 59/dL 헤모글로빈 저하	0.7	0.7	
- 수술적 치료 요구	0.7	0.9	
- 출혈성 뇌졸중	0.1	0.1	
- 변색적 사상이 요구	0.5	0.5	
- 수술을 요구 (≥4 units)	1.2	1.0	
• 기타 주요한 출혈	1.6	1.0	0.005
- 상당한 지체되지 않는 부전	0.4	0.3	
- 상당한 시력 손실을 동반한 안구내 출혈	0.05	0.03	
- 2-3 units의 수술을 요구	1.3	0.9	
경미한 출혈***	5.1	2.4	< 0.001

- 적당한 다른 표준요법제가 치료중 사용되었습니다.
- (a) Clopidogrel + aspirin에 의한 주요한 출혈 증상의 발현률은 aspirin에 대해 용량 비례적이었습니다.
 - ($<100\text{mg} = 2.6\%$; $100\sim200\text{mg} = 3.5\%$; $200\text{mg} = 4.9\%$)
- (b) 위 약 + aspirin에 의한 주요한 출혈 증상의 발현률은 aspirin에 대해 용량 비례적이었습니다.
 - ($<100\text{mg} = 2.0\%$; $100\sim200\text{mg} = 2.3\%$; $200\text{mg} = 4.0\%$)
- 이로 인해, 약물의 투여가 중지되었습니다.
- CURE 연구에서, 대상 환자의 92%가 헤파린 및 저분자량 헤파린을 투여받았으며 이 들 환자의 출혈률은 이 약의 전반적인 결과와 유사하였습니다. 최소한 수술 5일 전부 터 이 약의 투여를 중단한 환자에서서 관상동맥회로우회술 이후 7일 이내에 주요한 출혈이 추가로 관찰되지 않았습니다(이 약과 아스피린 투여군에서 4.4%, 위약과 아스피린 투여군에서 5.3%). 관상동맥회로우회술 이전 5일 이내에 이 약을 투여 받은 환자군에서, 출혈성 증상의 발현률은 이 약과 아스피린 투여군에서 9.6%, 위약과 아스피린 투여군에서 6.3%였습니다.
- CLARITY연구에서 주요한 출혈(두개내 출혈 또는 헤모글로빈이 5g/dL 이상 감소 하는 것과 관련된 출혈)의 발생은 두 투여군에서 유사하게 나타났습니다(이약+아스피린 vs 위약+아스피린)

피린 투여군과 위약+아스피린 투여군에서 각각 1.3% vs 1.1%). 이는 기본적인 특징과 섬유소 용해제의 유형 또는 헤파린 요법에 따른 환자 서브그룹에서 일관되었습니다. 치명적인 출혈의 발생 (이 약+아스피린 투여군과 위약+아스피린 투여군에서 각각 0.8% vs 0.6%)과 두개내 출혈(각각 0.5% vs 0.7%)은 두 그룹에서 낮고 비슷하게 나타났습니다. COMMIT연구에서 뇌 이외의 주요한 출혈 또는 뇌에서의 출혈은 위 표에서와 같이 두 그룹에서 낮고 비슷하게 나타났습니다. COMMIT연구에서 출혈이 발생한 환자수(%)는 다음과 같습니다.

출혈	클로피도그렐(+아스피린) (N=22,961)	위약(+아스피린) (N=22,891)	P-Value
주요한 뇌 이외의 출혈 또는 뇌에서의 출혈**	134 (0.6%)	125(0.5%)	0.59
주요한 뇌 이외의 출혈	82 (0.4%)	73 (0.3%)	0.48
치명적	36 (0.2%)	37 (0.2%)	0.90
출혈성 뇌졸중	55 (0.2%)	56 (0.2%)	0.81
치명적	39 (0.2%)	41 (0.2%)	0.81
다른 뇌 이외의 출혈 (주요하지 않은)	831 (3.6%)	721 (3.1%)	0.005
그 밖의 뇌 이외의 출혈	896 (3.9%)	777 (3.4%)	0.004

- 혈액학적 장애(호중구감소증/무혈판구증 등)
 - CAPRIE 연구에서, 증종의 호중구감소증(<0.450G/L)이 6례 발생하였는데, 이중 이 약 투여군에서 4례(0.04%), 아스피린 투여군에서 2례 (0.02%) 발생하였습니다. 이 약을 투여한 환자 9,599명중 2명의 호중구 수치기 0이었으나, 아스피린을 투여한 9,586명의 환자에서는 이러한 증상이 나타나지 않았습니다. 이 약 투여군의 4명의 환자 중, 1명은 세포독성 화학요법을 받고 있었으며 다른 1명은 이 약의 일시적 중단후 회복되어 임상시험에 복귀하였습니다.
 - * 이 약의 화학적으로 유사한 티클로피딘에 의한 증종의 호중구감소증 발생률은 0.8%이었습니다(<0.450G/L). 재생불량성 빈혈이 이 약 투여군에서 1례 발생하였습니다. 증종의 혈소판감소증 (<80G/L) 발생률은 이 약 투여군에서 0.2%, 아스피린 투여군에서 1.9%였으며, 혈소판 수가 30G/L 이하로 감소한 사례는 매우 드물게 보고되었습니다.
 - CURE 연구에서, 혈소판감소증 발생률은 이 약과 아스피린 투여군에서 19명, 위약과 아스피린 투여군에서 24명, 위약과 아스피린 투여군에서 3명 발생률은 각각 3명씩으로 유사하게 나타났습니다. 이 약의 골수 독성 위험은 상당히 낮지만, 이 약을 투여한 환자에서 열 또는 다른 혈장 증상이 나타날 경우에는 골수독성의 가능성을 고려하여야 합니다.
- 위장관계 증상
 - CAPRIE 연구에서, 전반적인 이 약을 투여한 환자에서 위장관계 증상에, 복부통, 소화 불량, 위яз열 또는 변비의 발생빈도는 27.1%인데 비해, 아스피린을 투여한 환자에서는 29.8%였습니다. CURE 연구에서의 위장관 증상의 발생빈도는 이 약과 아스피린 투여군에서 11.7%, 위약과 아스피린 투여군에서 12.5%였습니다. CAPRIE 연구에서, 소화성(위 또는 십이지장) 궤양의 발생빈도 는 이 약 투여군은 0.7%, 아스피린 투여군은 1.2%이었습니다. CURE 연구에서는 소화성(위 또는 십이지장) 궤양의 발생빈도는 이 약과 아스피린 투여군에서 0.4%, 위약과 아스피린 투여군에서 0.3%였습니다. CAPRIE 연구에서, 설사는 아스피린 투여군에서 3.4%인데 비해 이 약 투여군에서는 3.4%였습니다. 하지만, 증종은 거의 나타나지 않았습니다(이 약 투여군 0.2%, 아스피린 투여군 0.1%). CURE 연구에 의하면, 설사가 이 약과 아스피린 투여군에서 2.1%, 위약과 아스피린 투여군에서 2.2% 나타났습니다. CAPRIE 연구에서, 위장관계 이상반응으로 투여를 중단한 환자의 빈도는 이 약 투여군에서 3.2%, 아스피린 투여군에서는 4.0%였습니다. CURE 연구에 의하면, 위장관계 이상반응으로 인해 투여가 중단된 환자의 빈도가 위약과 아스피린 투여군에서 0.8% 인데 비해서 이 약과 아스피린 투여군에서는 0.9%였습니다.
- 발진 및 기타 피부 질환
 - CAPRIE 연구에서, 이 약을 투여한 환자군의 피부 및 피부 부속기관에 이 이상반응 발생빈도는 15.8%였으며(증종 이상반응 0.7%), 아스피린을 투여한 환자군에서는 13.1%였습니다(대중증 이상반 응 0.5%). CURE 연구에서의 피부 및 피부 부속기관 의 이상발생 빈도는 이 약과 아스피린 투여군에서는 4.0%, 위약과 아스피린 투여군에서는 3.6%였습니다. CAPRIE 연구에서, 피부 및 피부 부속기관의 이상반응으로 이 약의 투여를 중단한 환자의 전반적인 발생 빈도가 1.5%인 반면, 아스피린 투여군에서는 0.8%였습니다. CURE 연구에 의하면, 피부 및 피부 부속기관의 이상반응으로 약의 투여를 중단한 환자의 발생 빈도가 이 약과 아스피린 투여군에서는 0.7%, 위약과 아스피린 투여군에서는 0.3%였습니다.
- CAPRIE 임상 연구에서 이 약과의 관련성과 관계없이 이 약을 투여받은 환자군에서 그 발현률이 2.5% 이상인 이상반응은 아래와 같았습니다. 평균 치료기간은 20개월이었고, 최장 치료 기 간은 3년이었습니다.

- CAPRIE 연구에서, 이 약을 투여한 환자군에서 2.5% 이상 나타난 이상반응

증상	%빈도(%증단)	
	클로피도그렐(n=9,599)	Aspirin(n=9,586)
전신 질환		
발진	8.3(0.2)	8.3(0.3)
신호성 상태	7.9(0.1)	7.3(0.1)
이물투여자 유사질환	7.5(0.1)	7.0(0.1)
피로	6.4(0.1)	6.3(0.1)
	3.3(0.1)	3.4(0.1)
심혈관 질환		
부정 고혈압	4.1(<0.1)	4.5(<0.1)
	4.3(<0.1)	5.1(<0.1)
중추 및 말초신경계 질환		
통풍	7.6(0.3)	7.2(0.1)
한기증	6.2(0.2)	6.7(0.3)
위장관 질환		
복부통	5.6(0.7)	7.1(1.0)
소화불량	5.2(0.6)	6.1(0.7)
설사	4.5(0.4)	3.4(0.3)
대사 및 영양질환		
고콜레스테롤혈증	4.0(0)	4.4(<0.1)

- CURE 연구에서, 이 약과의 관련성과 관계없이 이 약을 투여받은 환자군에서 그 발현률이 2.0% 이상인 이상반응은 아래와 같았습니다.

- CURE 연구에서, 이 약을 투여한 환자군에서 2.0% 이상 나타난 이상반응

증상	%빈도(%증단)	
	클로피도그렐(n=9,599)	Aspirin(n=9,586)
중추 및 말초신경계 질환		
통풍	6.3(0.1)	6.2(0.1)
한기증	5.8(0.1)	5.3(<0.1)
심혈관 질환		
발진/자상	5.3(0.3)	3.7(0.1)
비출혈	2.9(0.2)	2.5(0.1)
정신질환		
우울	3.6(0.1)	3.9(0.2)
호흡기계 질환		
상부호흡기계 감염	8.7(<0.1)	8.3(<0.1)
호흡 곤란	4.5(0.1)	4.7(0.1)
기관지염	4.2(<0.1)	4.2(<0.1)
기침	3.7(0.1)	3.7 (0)
	3.1(<0.1)	2.7(<0.1)
피부 및 부속기관 질환		
발진	4.2(0.5)	3.5(0.2)
소양증	3.3(0.3)	1.6(0.1)
대사 및 영양 질환		
요로 감염	3.1(0)	3.5(0.1)

증상	%빈도(%증단)	
	클로피도그렐(+ aspirin) ^(a) [n=6,259]	위 약(+ aspirin) ^(b) [n=6,303]
전신 질환		
총종	2.7 (<0.1)	2.8 (0.0)
중추 및 말초신경계 질환		
통풍	3.1 (0.1)	3.2 (0.1)
한기증	2.4 (0.1)	2.0(<0.1)
위장관계 질환		
복부통	2.3 (0.3)	2.8 (0.3)
소화불량	2.0 (0.1)	1.9(0.1)
설사	2.1 (0.1)	2.2 (0.1)

- 가) 외에, CAPRIE 또는 CURE 연구에서, 이 약 투여와 관련 없이 이 약의 1% ~ 2.5%에서 나타난 발현 가능성이 있는 중요한 이상반응들은 다음과 같습니다. 일반적으로, 이 증상들의 빈도는 아스 피린 투여군(CAPRIE 연구에서) 또는 위약과 아스피린 투여군(CURE 연구에서)과 유사하였습니다.
 - 자율 신경계: 심신, 심계항진
 - 전신 질환: 무력증, 발열, 헤르니아
 - 심혈관 질환: 심부전
 - 중추 및 말초 신경계 질환: 다리 경련, 감각 감퇴증, 신경통, 감각이상증, 현훈
 - 위장관 질환: 변비, 구토
 - 심박수와 심박율 질환: 심방세동
 - 간과 담즙성 질환: 간효율성: 간효율성의 증가
 - 대사와 영양 질환: 통풍, 고요산혈증, 비탄백질성 혈소(NPN)의 증가
 - 근골격 질환: 관절염, 관절증
 - 혈소판, 출혈과 응고 질환: 위장관 출혈, 혈종, 혈소판 감소
 - 정신 질환: 불안, 불면증
 - 적혈구 질환: 빈혈
 - 호흡기 질환: 폐렴, 부비동염
 - 피부 및 피부 부속기관의 질환: 습진, 피부 궤양
 - 비뇨기계 질환: 방광염
 - 시각 질환: 백내장, 결막염

- CAPRIE 또는 CURE 연구에서, 이 약 투여와 관련 없이 1% 이하로 드물게 보고되었지만 임상적으로 중요하고 발현 가능성이 있는 증종의 이상 반응은 다음과 같습니다. 일반적으로 이들 증상의 빈도는 아스피린 투여군(CAPRIE 연구에서) 또는 위약과 아스피린 투여군(CURE 연구에서)과 유사하였습니다.
 - 전신: 알레르기 증상, 허혈성 괴사
 - 심혈관 질환: 전신 부종
 - 위장관 질환: 위염, 출혈성 위장염, 십이지장 궤양, 위궤양, 천공성 위궤양, 상부 위장관 궤양 출혈, 고창
 - 간과 담즙성 질환: 빌리루빈혈증, 감염성 간염, 지방간
 - 혈소판, 출혈과 응고성 질환: 출혈성 관절증, 혈노증, 객혈, 두개내출혈, 후복막 출혈, 수술상처출혈, 안구출혈, 폐출혈, 자반 알레르기, 혈소판 감소증, 출혈시간 증가
 - 적혈구 질환: 재생불량성 빈혈, 혈색소감소 빈혈
 - 생식 질환: 여성: 월경 과다
 - 호흡기계 질환: 혈흉증
 - 피부 및 피부 부속기관의 질환: 대두포진, 홍반성 피진, 반점성구진, 두드러기
 - 비뇨기계 질환: 신기는 이상, 급성 신부전
 - 백혈구 및 세네타미피조제 질환: 무혈판구증, 과립구 감소증, 백혈병, 백혈구감소증, 호중구감소증, 호산구감소증

- 외국에서의 시판 후 사용을 통해 보고된 이상반응을 발현부위별로 아래에 나타내었습니다. : 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100, (1/10), 때때로(≥1/1,000, <1/100), 드물게(≥1/10,000, <1/1,000), 매우 드물게(<1/10,000)
 - 혈액 및 림프계 질환: 매우 드물게,
 - 증종의 출혈: 주로 피부(자반), 근골격계(출혈성 관절증, 혈종), 안구(결막, 안구내, 망막 부위) 및 기도 부위에서의 출혈(객혈, 폐출혈), 비출혈, 혈노 및 수술 상처의 출혈
 - 치명적인 출혈(특히, 두개내내, 위장관내 및 후복막강 출혈)
 - 매우 드물게, 무혈판구증, 재생불량성 빈혈/혈색구 감소증 및 혈전성 혈소판감소성 자반종(TTP)(1/200,000 노출 환자). 증종의 혈소판 감소증 (혈소판 수치≤30 x 10⁹ / L)
 - 면역계 질환: 매우 드물게, 혼돈, 환각
 - 정신계 질환: 매우 드물게, 혼돈, 환각
 - 신경계 질환: 매우 드물게, 마각 이상
 - 혈관계 질환: 매우 드물게, 혈관염, 저혈압
 - 호흡기계 질환: 매우 드물게, 기관지경련, 간질성폐렴
 - 위장관계 질환: 매우 드물게, 대장염(궤양성 대장염 또는 림프포성 대장염 포함), 궤장염, 위염, 구내염
 - 간담도계 질환: 매우 드물게, 간염, 급성 간부전
 - 피부 및 피하조직 질환: 매우 드물게, 반점성구진 또는 홍반성 피진, 두드러기, 소양증, 혈관부종, 수포성 피부염(다형홍반, 스티븐스-존슨 증후군, 독성피피괴사증 등), 습진, 편평태선
 - 근골격계 질환: 매우 드물게, 관절통, 관절염, 근육통
 - 신장 및 비뇨기계 질환: 매우 드물게, 사구체병증
 - 전신 장애 및 투약부위 이상: 매우 드물게, 발열
 - 잠사자 이상: 매우 드물게, 감기증 수치 비정상, 혈액 크레아티닌 증가
- 국내 시판후 조사결과
 - (1) 국내에서 조사결과를 위하여 6년 동안 4,295명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 이상반응의 발현현례율을 인과관계와 상관없이 9.78%(420례/4,295례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과 관계가 있는 것으로 조사된 것은 6.50%(279례/4,295례)입니다. 한기증(1.19%(51례)로 가장 많았고, 그 다음은 소화불량 1.12%(48례), 두통 1.07%(46례)의 순으로 나타났습니다.
 - (2) 이 외에 1% 미만으로 보고된 이상반응은 다음과 같습니다.
 - 중추 및 말초신경계: 운동기능감소증, 진전, 음성장애, 비정상보행, 과운동증, 운동실조, 자각이상
 - 소화기계: 변비, 오심, 설사, 구강, 복통, 식욕부진, 구토, 말쑥질, 구갈, 연하곤란, 혀질환
 - 정신신경계: 불안, 우울증, 건망증, 불안, 경면, 사고이상, 비정상 행동
 - 골격계: 관절통, 근육통, 요통, 관절증
 - 신신이상: 총통, 체중감소, 체중증가, 인면홍조, 피로, 무력, 경직, 얼굴부종, 실신
 - 혈액계: 자반병, 열변, 비출혈, 출혈, 뇌출혈, 혈종, 혈노증, 객혈, 근육출혈, 두개내출혈, 안구출혈, 치은출혈, 혈소판감소증, 빈혈
 - 호흡기계: 기침, 호흡곤란, 아염
 - 감각기관: 시각이상, 시야장애, 안구건조증, 일시적 실명, 출혈, 이명, 시각도약
 - 요로계: 비뇨장애, 빈뇨증, 비탄백질소증, 요독증, 혈중요소질소증 증가
 - 대사 및 영양 이상: 저혈당증, 고요산혈증
 - 간 및 담도계: 간효소 증가, SGPT 상승, 감기증 이상
 - 심혈관계: 다리부종, 부종증, 사맥, 심계항진
 - 피부 및 부속기관(투여부위 포함): 발진, 소양감, 접촉피부염
 - 내분비 이상: 여성형유방
 - 생식기 이상(여성): 전립선특이항원(PSA) 상승
 - (3) 이 중 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응 중 약과의 인과관계를 배제할 수 없는 것으로 식욕부진, 체중감소 각 7건, 시각이상 4건, 경면, 체중증가, 인면홍조 각 3건, 운동 기능감소 각 3건, 건망증, 사고이상, 빈뇨증, 부종증 각 2건, 진전, 음성장애, 비정상보행, 과운동증, 운동실조, 말쑥질, 연하곤란, 혀질환, 비정상 행동, 경직, 시야장애, 안구건조증, 일시적 실 명, 총통, 체중증가, 요독증, 저혈당증, 식욕, 이명, 접촉피부염, 여성형유방, PSA상승 각 1건으로 보고되었습니다.

5. 일반적 주의

- 이 약 투여시 시간을 엄격히키므로 환자가 수술을 받기로 예정되어 있으며, 항혈소판 효과가 바람직하지 않은 경우에는 수술 5일 전부터 7일 전에 이 약의 투여를 중단하여야 합니다.
- 이 약 투여를 할때는 대 보통의 경우보다 오래 소요될 수 있음을 환자에게 알려주고, 출혈 이상이 발생할 경우 즉시 의사의 사에게 보고하도록 지도하십시오. 환자는 수술 계획전 또는 새로운 약물을 복용하기 전에 이 약을 복용하고 있음을 의사와 치과의사에게 알려야 합니다.
- 산물출혈 가능성이 높고, 신중한 전원이 필요함임. 이 약의 약물학적 효과를 역전시키기 위해서 혈소판의 수혈을 할 수 있음.
- 출혈 및 혈액학적 이상반응의 위험성이 있으므로, 치료 도중에 이러한 이상반응으로 의심되는 임상적 증상이 나타나면 혈구수정증(blood cell count determination) 또는 다른 적절한 검사를 즉시 고려하여야 합니다.

6. 사용작용

- 당단백 Ilb/IIIa 저해제: 이 약과 당단백 Ilb/IIIa 저해제 사이에 약력학적 상호작용이 있을 수 있으므로, 병용투여시 주의하여야 합니다.
- 아스피린: 이 약과