


칼슘함유 · 비타민제



신일제약(주)

일반의약품 분류번호 : 316

2B3D3M61205

【특징】

1. 도어-에스추어블정은 어린이에게 가장 적합하게 구성된 처방으로서, 어린이의 성장·발육에 꼭 필요한 비타민과 미네랄을 함유한 어린이 종합영양제입니다.
2. 특히 칼슘이 강화되어 인, 마그네슘과 함께 치아, 근골격 발육을 촉진함은 물론, 심장을 튼튼하게 하고 근육의 수축이완을 조절하여 에너지 생산에도 중요한 역할을 하므로, 어린이의 정상 신진대사를 원활하게 해줍니다.
3. 어린이들이 좋아하는 과일 모양과 향을 지녀 어린이가 씹어서 맛있게 섭취할 수 있도록 제조 하였습니.

【성분·함량】 (1정 중)

레티놀팔미테이트류(KPC)	1,000 IU	폴산(KP)	0.1mg
플래시파메롤라프(KPC)	1.15mg	니코틴산아미드 3배산(KPC)	16.2mg
(플래시파메롤라프	115 IU)	(니코틴산아미드)로서	5,281.2mg
타이민질산염 3배산(KPC)	1.95mg	판토탄산칼슘(KP)	3mg
(타이민질산염)로서	0.6357mg)	인산칼슘(BP)	128.21mg
리보플라빈포스페이트나트륨(KP)	0.75mg	(칼슘으로서	49.7mg)
피리독신염산염 3배산(KPC)	2.7mg	(총 칼슘으로서	50mg)
(피리독신염산염)로서	0.8802mg)	글리세로인산마그네슘(BP)	12mg
시아노코발라민 0.1%(KPC)	2mg	(마그네슘으로서	1.5mg)
아스코르브산(KP)	20mg	(총 인으로서	27.56mg)
토코페롤아세테이트 50%(KPC)	10mg	헥사제(테르스산) : 황색 5호	
(토코페롤아세테이트)로서	5 IU)		

【성상】 주황색포도당의 딸기모양, 오렌지모양, 포도모양이 새겨진 씹어먹는 원형 정제.

【효능·효과】

다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
- 발육기
- 노년기
- 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 비타민A(레티놀팔미테이트류) : 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
- 비타민D(플래시파메롤라프) : 뼈·이의 발육불량, 구루병의 예방

【용법·용량】

만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 2정을 입안에서 녹이거나 씹어서 복용
만 36개월 이상 ~ 만 8세 미만 : 1일 2회, 1회 1정을 입안에서 녹이거나 씹어서 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 입부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오.(비타민A 결핍증환자는 제외)

2) 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에게는 투여하지 마십시오.(60kg 성인 : 1일 최대복용량 24g)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 중증의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당불내증 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 3) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 입부 및 입안하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 5) 외국에서 임신 전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발생(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만으로 머물도록 하는 등 적절한 주의를 하십시오.
- 6) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 7) 신장·순환기계 기능 장애 환자
- 8) 신장(콩팥)장애 환자
- 9) 지단백혈증 환자
- 10) 강신배당체를 투여 중인 환자
- 11) 통풍 환자 또는 신장(콩팥) 결석이 있는 환자
- 12) 신장(콩팥)결석의 병력이 있는 환자
- 13) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 처방문을 소지하십시오.

- 1) 중성 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구토, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증, 관절부종(부기), 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(홍진)이 붙어짐, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부)팽만감, 지혈, 알칼리성, 심박동불규칙, 붉은 반점, 두전수축(심장박동정지), 중추신경계기능저하, 피부발진
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경우로 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘) 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 흡인이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소아성 괴혈을 촉진시키고 당내성(포도당)내성(glucosetolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대장투여로 인해 구토, 구토, 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 장기간 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 10) 장기간 고용량의 비타민D(비타카로니로부터) 전한 것을 제외한 것들 제외함) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈약성증)위험을 높일 수 있습니다.
- 11) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정제된 용병·용량에 잘 지켜주시고,
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여하십시오.
- 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 하십시오.
- 4) 각종 요염사시에 해당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 5) 요를 황색으로 변화시켜 하여 임상검사 치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 6) 독자, 총자 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관(1~30°C), 제조일로부터 3년

【포장 단 위】 자사포장단위 (외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드림. 공공거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

신일제약(주)
충청북도 충주시 양성면 북상길 28



설명서 작성년월일 : 2012.12.07