

항산화제 보강·종합활성비타민

비타카오 에프 정

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

엽산푸르실티아민(약전)	27,285mg	0.1%시아노코발라민(식품의약품청고시)	6mg
낙산리보플라빈(약전)	5mg	(시아노코발라민으로서 6μg)	
엽산피리독신(약전)	5mg	50%초산토코페롤(식품의약품청고시)	40mg
엽산(약전)	250μg	(비타민 E로서 20IU)	
비오틴(USP)	22.5μg	푸마르산철(약전)	13.5mg
니코틴산아미드(USP)	50mg	(철로서 4.4mg)	
판토텐산칼슘(약전)	20mg	산화아연(약전)	9.33mg
아스코르빈산90%과립(별규)	666.7mg	(아연으로서 7.5mg)	
(아스코르빈산으로서 600mg)		셀레늄함유건조효모(식품의약품청고시)	46.3mg
		(셀레늄으로서 25μg)	

[성상] 노란색의 장방형 필름 코팅정입니다.

[효능·효과] 1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보충

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후의 체력저하
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
- 비타민 C (아스코르빈산) - 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착 (기미, 주근깨) 의 완화, 잇몸출혈 · 비출혈 예방
- 비타민 B1 (엽산푸르실티아민) - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통 (요통, 건통 등), 각기, 눈의 피로

2. 아연의 보충

[용법·용량] 12 세 이상 어린이 및 성인: 1 회 2 정을 1 일 1 회 복용 또는 1 회 1 정씩 1 일 2 회 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.
- 철 함유 제제는 6 세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 12 개월 미만의 영아
- 혈색소증 (철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린 침착증, 비철결핍성 빈혈

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오)

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 과산화노증환자 (hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산화물이 배설되는 상태)
- 임부, 수유부
- 소화성 궤양, 만성 궤양성 대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 심장 · 순환기계 기능 장애 환자
- 신장에 환자
- 지단백혈증 환자
- 위장관질환

4. 부작용

- 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 붉은변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감, 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부 · 위통증, 경련, 열, 혼수, 피부염, 땀 · 호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 피리독신을 1 일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12 를 1 일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상 (glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증 (hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 용혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 투여하십시오.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

6. 상호작용

- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
나) 레보도파
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 임상 검사치에의 영향

- 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 적사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온 (1~30℃)보관 [포장단위] 100정

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품일 경우 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2006년 4월 25일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencross.com)나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매원

 주식회사 녹십자

충북 음성군 금왕읍 내송리 156-50 TEL.031)260-9300
소비자 상담실 TEL.080-260-0033

설명-10-1113-1