

셀레몬연질캡슐

SELEMON Soft Cap.

일반의약품

분류번호:319

■ 성분 · 함량 : 1캡슐(1310mg) 중

초산토코페롤(KP)	200mg
(비타민E로서 200IU)	
베타카로틴30%현탁액(KPC)	10mg
(베타카로틴으로서 3mg)	
아스코르빈산(KP)	250mg
산화아연(KP)	9.337mg
(아연으로서 7.5mg)	
산화제이동(KPC)	1.252mg
(동으로서 1mg)	
셀레늄0.1%가루(KPC)	40mg
(셀레늄으로서 40 μg)	
황산망간(USP)	4.613mg
(망간으로서 1.5mg)	

■ 성 상 적각색의 내용물이 든 암갈색의 방형형 연질캡슐

■ 효능 · 효과

- 다음 경우의 비타민 A, C, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후의 체력저하시
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조함의 완화, 야맹증
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목경림, 수족저림 · 수족냉증
 - 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착 (기미, 주근개)의 완화, 잇몸출혈 · 비출혈 예방
- 아연의 보급

■ 용법 · 용량 성인 1일 2회, 1회 1캡슐씩 식후복용

■ 사용상의 주의사항

- 경고

임부에 비타민 A (레티놀)를 1일 5,000 IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가임성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 않는다 (비타민 A 결핍증 환자는 제외).
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아
 - 3) 원소색병
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과산화노증환자 (hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 담낭 · 췌관 질환
 - 4) 심장 · 순환기계 기능 장애환자
 - 5) 신장에 환자
 - 6) 저단백혈증환자
 - 7) 담낭관련질환, 간질환자환자
 - 8) 위장관질환
- 이상반응
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종
 - 위부부종, 설사, 변비, 발진, 발적
 - 상복부통증, 혼수
 - 피부염, 땀 · 호흡기 약취, 발모, 조급증
 - 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 빨라지거나 양이 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경우를 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량 투여할 경우 내상시 생길 수 있다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 혈혈성 심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 상호작용
 - 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼혈증증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다 : 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 특징, 용량, 투여 방법

1) 약제, 용량, 투여 방법 : 이 약을 투여하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- 임부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

1) 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등 중증으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민 A 결핍증치로 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 임상시험치에의 영향 : 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 뒀 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오 · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

■ 포장단위 : 자사포장단위

■ 제 조 자 : 알앤피코리아(주) 경기도 화성시 함남면 상신리 906-6

■ 유효 기 간 : 제조일로부터 36개월

■ 제조회자 : (주)넥스팜코리아 충북 진천군 문백면 장일리 112-3

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질 · 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화(02)3473-6365로 하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

개정년월일 : 2008년 02월 15일

판매원

조일형 휴먼헬스케어 기업



광동제약



주식회사

제조원

넥스팜코리아

충북 진천군 문백면 장일리 112-3



적격인증제품