

육체 피로 · 체력저하

리맥스 연질캡슐

Remax Soft Cap.

【성상】

활색 유상물질이 들어있는 적자색의 장방형 연질캡슐

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

레티놀팔미테이트(KP)	5000 I.U
에르고칼시페롤(KP)	400 I.U
티아민염산염(KP)	2mg
리보플라빈(KP)	3mg
아스코르브산(KP)	75mg
니코틴산아미드(KP)	20mg
착색제(타르색소) : 청색1호, 적색40호	적량

【효능 · 효과】

- 다음 증상의 비타민 A, D, B₁, B₂, C의 보급
- 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시, 발육기 및 노년기
- 눈의 건조감의 완화
- 야맹증
- 뼈, 이의 발육촉진
- 구루병의 예방

【용법 · 용량】

성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

임부에 비타민A (레티놀)를 1일 5000 I.U 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5000 I.U/일 이상 투여하지 않는다. (비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 과칼슘혈증 (hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 3개월 미만의 영아

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. (복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
- 4) 과수산노증 환자 (hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 5) 임신, 수유부

4. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친피부, 동증성 관절부종, 설사, 묽은변 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

- 3) 고응량의 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상 (glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증 (hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000I.U 이상을 넘지 않도록 한다.

6. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10000I.U/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 중심으로 하는 기형발현 증가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5000I.U/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 2) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

7. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

8. 저장상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

1, 500캡슐

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://www.skynewpharm.com>이나 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2008. 5. 23 (Rev.0)