

KGMP

적격업소

일반의약품

분류번호:321

비타민D 및 칼슘보급제

칼페롤정

calferol Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

탄산칼슘(USP).....1250.0mg

(칼슘으로서 500mg)

콜레칼시페롤농축분말(EP).....10.0mg

(콜레칼시페롤로서 1000IU)

【성상】

녹색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D의 보급

- 임신·수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방

2. 칼슘 결핍 및 기타 칼슘 보급

【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 어린이 : 1일 1회 1정을 복용.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 복용하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia ; 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자. 3) 12개월 미만의 영아 4) 신결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 다음 환자에는 신중히 복용하십시오(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오).

- 1) 1세 미만의 영아 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 복용을 피하십시오. 4) 임부, 수유부 5) 심장 순환기계 기능 장애 환자 6) 신장에 환자
- 7) 저단백혈증 환자 8) 강심배당체를 복용 중인 환자

3. 이상반응

- 1) 이 약 복용에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
- 2) 대량(많은 양)복용으로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부기 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 3) 장기 복용에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선(나아짐)이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 항알도스테론, 트리암테렌과 함께 복용 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 복용할 경우에는 다음의 약물과 함께 복용하지 않습니다. - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

6. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 복용

비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오. 3) 오남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 120T, 300T

※본 의약품은 우수약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용(유효)기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변폐 또는 오손된 제품을 구입 했을때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다.

작성일: 2006.8

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



판매원
(주)동남약품
충남 천안시 다가동 373-3번지
Tel 041-578-5140(-4)



제조원
우리팜제약주식회사
충북 제천시 왕암동 933번지 Tel 043-652-5445
고객상담실 Tel 080-511-6868