



코엔자임큐텐, UDCA함유 항산화제

브이텐[®] 연질캡슐

일반의약품

분류번호 : 316 혼합비타민제 (비타민AD 혼합제제를 제외)

브이텐연질캡슐은 코엔자임큐텐과 베타카로틴, 비타민 C, 토코페롤, 셀레늄, 아연이 이상적으로 배합된 항산화 영양제로, 각 항산화성분은 암, 성인병, 노화의 원인인 활성산소를 직접 제거함으로써 인체 정상세포를 보호하고 각종 질병과 노화로부터 우리 몸을 보호합니다. 또한 말초혈행장애를 개선하여 어깨·목결림, 손발저림, 손발냉증을 줄여주며 우르소데옥시콜산(UDCA)이 추가되어 육체피로, 체력저하, 갱년기 장애에 더욱 효과적입니다.

성분·함량 1캡슐 중

베타카로틴30% 현탁액(KPC)	10mg
(베타카로틴으로서 3mg)	
토코페롤아세테이트(KP)	200mg
(비타민E로서 200IU)	
아스코르브산(비타민C)(KP)	500mg
셀레늄0.1%가루(KPC)	25mg
(셀레늄으로서 25μg)	
유비데카렌(코엔자임큐텐)(KP)	5mg
산화아연(KP)	17.43mg
(아연으로서 14mg)	
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
첨가제(타르색소) : 청색 1호, 적색 40호	

성상



적갈색의 내용물을 함유한 어두운 적색의 장방형 연질캡슐



- * 그림과 같이 캡슐포장의 볼록한 부분을 화살표방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다.
- * 이 때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.
- * 충분한 양의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.

효능·효과

- 다음 경우의 비타민 A,C,E의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 포함된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈·비출혈 예방
- 아연의 보급

용법·용량

12세 이상 성인 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용합니다.

사용상의 주의사항

- 경고
임신한 여성이 비타민A(레티놀)을 1일 5,000 IU 이상 복용하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인은 비타민A를 5,000 IU/일 이상 복용하지 않습니다.(비타민A 결핍증 환자는 제외)
- 다음 환자는 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 12개월 미만의 영아
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자는 신중히 복용합니다(복용전 의사 또는 약사와 상의합니다.).
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 임신한 여성, 수유부
 - 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장에 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 위장관질환 환자
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 이상반응
 - 이 약 복용에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - : 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친피부, 통증성 관절부종, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종

- 이 약의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 에스트로젠을 포함한 경구용 피임약을 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우에는 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 오랜 기간 많은 용량을 복용할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 많은 양의 복용으로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부어오름 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 상호작용

- 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용할 경우 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- 이 약을 복용할 경우에는 다음의 약물과 함께 복용하지 않습니다.
 - : 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제, 레보도파
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 드시지 마십시오.

7. 임신한 여성의 복용

외국에서 임신 전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인은 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 복용하지 않습니다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 복용은 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.

8. 임상 검사치에의 영향

각종 뇨검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항



1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.



2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.



3) 잘못된 사용을 피하고, 품질의 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

저장 방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

* 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온 다습한 곳을 피하여 보관하시기 바랍니다.

사용기한 외부포장에 표기

* 블리스터 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.
예) 제조번호 #9001, 사용기한 2012. 01. 07인 경우 → “9001/120107” 로 표시

포장단위 180캡슐(90캡슐×2)

* 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 “소비자분쟁해결기준”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

* 이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안개정년월일 2010. 1. 7
사용기한은 외부포장에 표기



제조의뢰·판매원

유한양행

본사 : 서울시 동작구 대방동 49-6
공정 : 충북 청원군 오창읍 양청리 807-1

www.yuhan.co.kr
대표전화 : 02-828-0181
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자요금부담)

제조원

(주)서흥캡셀/경기도 부천시 소사구 송내동 315, 317