

09266

복합 항산화 성분의 고단위 함유 비타민제

뉴란스® 코큐텐 정

뉴란스® 코큐텐정은 고단위 함유된 비타민 C, E 이외에 비오틴, 셀레늄, 코엔자임큐텐 성분을 강화하여 한층 강화된 항산화작용을 지닙니다. 각종 질병과 노화의 원인이 되는 활성산소(Oxygen Free Radical)를 억제하고 혈액순환장애, 고지혈증, 관상동맥 질환 등의 만성질환의 예방에 효과적입니다.

이외에 비타민 B군과 필수 미네랄 아연 등의 작용으로 육체피로, 색소침착(기미, 주근깨), 병중·병후시 체력저하, 신경통 또는 근육통 등의 증상을 개선시키는 종합 영양제 입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

유비데카레논 (약전)	5mg
건조비타민 E 50% (별규)	100mg
(초산토코페롤로서 50 I.U.)	
아스코르빈산 97 (별규)	618.6mg
(아스코르빈산으로서 600mg)	
엽산 (약전)	0.2mg
질산치아민 (약전)	15mg
리보플라빈 (약전)	10mg
엽산피리독신 (약전)	5mg
시아노코발라민 0.1% (별규)	5mg
(비타민 B ₁₂ 로서 5μg)	
판토텐산칼슘 (약전)	20mg
황산아연 (USP)	24.7mg
(아연으로서 9mg)	
셀레늄함유건조효모 (KPC)	50.9mg
(셀레늄으로서 27.5μg)	

【성 상】 살구색의 타원형 필름코팅정**【효능·효과】**

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급: 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)
- 각기
- 눈의 피로
- 다음 증상의 완화: 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈·비출혈 예방
- 아연의 보급

【용법·용량】

12세 이상 및 성인: 1일 1회 2정 복용 또는 1일 2회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 심장·순환기계 기능 장애 환자
 - 5) 신장장애환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 위장관 질환
- 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 피부염, 땀호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화 장애, 상복부 통증, 저혈압, 폐부종
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
 - 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 상호작용
 - 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

【포장단위】 자사포장단위

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리 기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

【연 락 처】 서울 : 본사(TEL (02)8288-114) 또는 구입하신 약국

지방 : 각지방 지점 또는 구입하신 약국

부산 (051) 645-2232

대구 (053) 742-2233

645-2390~1

대전 (042) 257-0881, 253-2273

청주 (043) 283-8111

마산 (055) 251-3431~3

광주 (062) 372-8114

제주 (064) 742-4992

전주 (063) 285-6507

인천 (032) 431-3737

원주 (033) 743-4474

수원 (031) 890-8114

경주 (054) 741-4360

제조·판매



부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 목내동 404-4

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233

<http://www.bukwang.co.kr>

※이 첨부문서 작성일자(2006년 9월 25일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.