

122016

흉터치료제

클리벡스[®]겔

부광약품 클리벡스 겔은 수술, 화상, 외상으로 인한 흉터 및 미용적 피부 손상시 환부에 도포함으로써 정상 피부로의 회복을 빠르게 유도합니다. 항염증, 진정작용 뿐 아니라 조직을 부드럽고 느슨하게 하고 흉터부위의 과증식을 억제함으로써 흉터부위의 붉은 색을 정상 피부색과 비슷하게 하며 흉터의 크기 또한 줄여 줍니다.

【원료약품 및 그 분량】1g 중

헤파린나트륨(EP)	50 I.U. (헤파린나트륨으로서 0.4mg)
양파연조엑스(1.8→1) (별규)	100mg
알란토인(USP)	10mg
첨가제(보존제): 소르빈산(EP)	1mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP)	1.5mg
첨가제(동물유래): 헤파린나트륨(기원동물: 소, 사용부위: 혈청)	

【성상】

밝은 갈색의 불투명 겔제

【효능·효과】

수술, 절단, 화상, 사고 후의 비대성·켈로이드성, 운동제한성 또는 미용적 피부 손상의 상처 및 흉터, 외상성 경축, 상흔성 협착

【용법·용량】

상처 부위에 충분히 침투할 때까지 1일 수 회(여러 차례) 가볍게 마사지 한다. 상처가 심하거나 오래된 흉터일 경우 드레싱으로 고정하여 하루 저녁을 지낸다. 갓 생긴 상처의 경우, 극도의 추위, 자외선, 강한 마사지 등 신체적 자극을 피한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 파라옥시벤조산메틸 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 2) 임부
 - 3) 절개되거나 아물지 않은 상처, 점막 피부에 진물이 나는 상처부위를 가진 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
수유부

3. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 장기간 사용 후 내성이 나타날 수 있으므로 주의할 것.
- 2) 매우 드물게 국소(부분) 피부자극이 나타날 수 있으므로 주의할 것(국내에서 647명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 가려움 7건, 과민반응 1건이 보고되었다.)
- 3) 상처가 태양열이나 광선에 노출되지 않도록 주의할 것. 갓 생긴 상처의 경우 극도의 추위나 자외선 또는 강한 맛사지 등 물리적 자극을 피할 것.
- 4) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못된 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 10, 20그램/튜브

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매

부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 능안로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2016년 12월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.