

셀 트 란 정

SELTRAN Tab.

■ 성 상

적갈색의 장방형 필름코팅정

■ 성분 · 함량 : 1정 중

아스코르빈산(약전)	400mg
50%족산토코페롤(KPC)	60mg(비타민E로서 30I.U.)
질산치아민(약전)	25mg
리보플라빈(약전)	12mg
니코틴산아미드(약전)	30mg
판토텐산칼슘(약전)	20mg
염산피리독신(약전)	8mg
엽산(약전)	200μg
0.1%시아노코발라민(KPC)	12mg(시아노코발라민으로서 12μg)
셀레늄합유견조효모(KPC)	18.52mg(셀레늄으로 10μg)
합산아연(약전)	65.97mg(아연으로서 15mg)
산화마그네슘(약전)	20mg(마그네슘으로서 12.05mg)

■ 효능 · 효과

- 다음 결주의 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로, 수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
- 각기, 눈의 피로
- 아연의 보급

■ 용법 · 용량

성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아
- 3) 중증의 심부전 환자
- 4) 임부

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의한 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과산화노중환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과당의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 수유부
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장에 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 위장관 질환

3. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. : 위부불쾌감, 설사, 변비, 말진, 발적, 구역, 구토, 묽은변, 흉반, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 피부염, 팔·호흡기 약화, 탄도, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부등증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨리지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.

- 3) 에스프로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10 μ g이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 순혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 상호작용
 - 1) 항알도스테론제, 트리암데넌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - 가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 나) 레보도파
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
6. 임상검사치에의 영향
 - 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 2) 오줌 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

■ 포장단위 : 30, 100, 200정

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 꾀한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재점검제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

문안작성일 : 2007. 1. 16

SKY NEW **주) 스카이뉴팜**
경기도 시흥시 대마동 418-21
PHARM



※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://www.skynewpharm.com>이나 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.