

알비라민

연질
캡슐

알비라민연질캡슐에는 로알젤리가 함유되어 있어 체내 신진대사를 회복, 유지시켜주므로 활기찬 생활을 할 수 있도록 도와줍니다. 또한 알비라민연질캡슐에는 비타민C와 비타민E 그리고 비타민 B complex가 복합처방 되어있어 말초 혈행 장애와 갱년기에 흔히 나타나는 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증에 탁월한 효과를 나타내며, 임신·수유기, 노년기, 병중·병후의 체력 저하시 발생할 수 있는 비타민 결핍증에도 응용할 수 있습니다.

알비라민연질캡슐은 연질캡슐제제이므로 약효발현이 신속하며, 로알젤리와 각종 비타민 성분의 복합제로서 부작용이 적게 나타나는 제제입니다.

【원료약품 및 분량 : 1캡슐 중】

로알젤리(KPC)	20 mg
(10-히드록시-2-데케노인산으로서 0.8mg)	
초산토포페롤 (KP)	45 mg
(비타민E로서 45IU)	
아스코르빈산 (KP)	100 mg
엽산치아민 (KP)	5 mg
리보플라빈 (KP)	2 mg
엽산피리독신 (KP)	5 mg
시아노코발라민 (KP)	12 µg
니코틴산아미드 (KP)	40 mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호, 황색203호	

【성상】 황갈색의 유상물이 든 양면 적갈색의 연질캡슐제

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증

【용법·용량】 1회 1캡슐, 1일 3회 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 임부·수유부
- 이상반응
 - 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
: 위부불쾌감, 설사, 묽은 변, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 엽산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 장애를 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용한다.
- 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 레보도파 약물과 병용투여하지 않는다.
- 임상검사치에의 영향
 - 각종 뇨검사시 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

* 이지드릭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조

* 본 의약품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다.
만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다.

☎ 080-311-2222

* 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 개정일자(2008년 8월)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr)또는 전화 (031)550-0474-8 (주)일화 학술·개발부를 통해 확인할 수 있음

최종개정년월 : 2008년 8월



ILHWA Ph.

●제조외의·판매자 : (주)일화
 ●경기도 구리시 수택동 437 ●http://www.ilhwa.co.kr
 ●제조자 : (주)동구제약/경기 화성시 향남읍 상신리 901-3