

# 뮤코라민 정 (레바미피드)

## Mucoramin Tablet

원료약품의 분량 1정 중

레바미피드(LPC) 100mg

### 성상

원색의 원형 필름코팅정

### 요능·효과

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위장약병변(이식, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

### 용법·용량

1. 위궤양  
보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그램)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침 전에 경구투여한다.
2. 다음 질환의 위장약 병변(이식, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기  
보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그램)을 1일 3회 경구 투여 한다.

### 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.  
이 약 성분에 과민을 병행 환자
2. 부작용  
여기서 '드물게'는 0.1% 미만일, '때때로'는 0.1~5% 미만일, 아무런 표현이 없는 것은 5% 이상 또는 빈도 불변을 의미함.  
 1) 중대한 부작용  
 ① 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.  
 ② 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.  
 2) 기타 부작용  
 ① 과민증 : 드물게 발진, 가려움, 약전향 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지한다.  
 ② 정신신경계 : 머리, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있다.  
 ③ 소화기 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 이각이상 등이 나타날 수 있다.  
 ④ 혈액 : 때때로 백혈구 분획중, 분염핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있다.  
 ⑤ 기타 : 유선 부종, 유선 종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유방, 월경 이상, 심계항진, 발열, 안면 홍조, 혀의 마비, 속가래 또는 드물게 폐기 상승, 무중, 연두부 이물감 등이 나타날 수 있다.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여  
 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성에 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.  
 2) 모유수유에서 모유 중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피한다.
4. 소아에 대한 투여  
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
5. 고령자에 대한 투여  
고령자에 있어서 확인된 부작용 종류 및 부작용 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화가 용성등의 부작용에 주의한다.

### 저장방법

차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

### 포장단위

30, 100정

본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

작성일 이후 변경된 내용은 [www.huons.com](http://www.huons.com)에서 확인하실 수 있습니다. 작성일 : 2007.02.28

주식회사 휴온스

소비자 상담실(반응 및 교환처) : 080-447-4700

경기도 화성시 향남면 삼신리 907-6  
907-6, Sangshin-ri, Hyangnam-myun,  
Hwaseong-city, Kyunggi-do, Korea

**Huons**