

효과빠른 근육이완제

렉스펜^정

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 어린이 보호용 안전포장 적용 제품입니다.
개봉시 강하게 눌러 주십시오.



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

클로르록사존(KP).....	250mg
아세트아미노펜(KP).....	300mg

[성상] 흰색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

신경통, 근육통, 관절통, 요(허리)통, 염좌통(뻘 통증), 건통(어깨통증), 근경련(근육경련), 근경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제 질환.

[용법·용량]

성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈 속)을 피하여 복용한다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

- 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 클로르록사존에 과민증 환자
 - 아세트아미노펜에 과민증 환자
 - 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
 - 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우, 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안됩니다.
- 복용시 주의사항
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족(손발)이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하여 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
 - 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 심한 간, 신장애(신장장애) 환자 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자
- 부작용
 - 과민증 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출혈(피부에 검보라빛 얼룩점이 생기는 내부출혈), 요변색(소변색이 변함) 등이 나타날 수 있습니다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 간장 : 클로르록사존에 의해 간손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지하십시오.
 - 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있습니다.
 - 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있습니다.
- 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우 투여하십시오.
- 상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용(함께 복용)투여시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다. ※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시기거나 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 개정 연월일 : 2015.03.24