

천연 식물성 여성 호르몬 대체요법 제제

페미너스에스정

Femina-S Tab

【원료약품의 분량】 1정(330mg) 중

승마추출액(KPC) 0.0364mL

히페리시 80%메탄올 건조엑스(KPC) 84.0mg

적색40호(KPTaCS) 적량

【성상】 분홍색의 원형 필름코팅 정제

【효능·효과】

폐경기의 다음 증상

- 홍조, 발한, 의욕저하
- 의기소침, 정신적 긴장, 신경과민, 집중력 부족, 불면, 불안 또는 불쾌감 등의 자율신경 장애
- 생리전의 불수의적(psychovegetative)이상 증상

【용법·용량】

1회 1정씩 1일 2회, 필요시 1회 2정씩 1일 2회 복용하십시오.

아침, 저녁 씹지 않고 물과 함께 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이약의 성분에 과민한 환자
- 2) 기저의 피부 광과민성 환자
- 3) 임부 및 수유부 (사용경험이 충분하지 않다)

2. 이상반응

- 1) 햇볕에 대한 피부의 민감성이 증가하는 광과민 반응이 특히, 피부가 흰 사람에게서 유발될 가능성이 있다.
- 2) 간독성 이상반응이 보고된 바 있으며, 간질환으로 의심되는 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 피로, 불안, 위장관 장애가 나타날 수 있다.

3. 일반적인 주의

- 1) 이약을 투여하는 중에 간질환으로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위의 통증, 진한 뇨 등)이 나타날 때에는 이 약의 복용을 중단하고 즉시 의사와 상담하여야 한다.
- 2) 이전에 간질환 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위해가 있었던 환자는 의사와의 상담하에 복용하여야 한다.

4. 상호작용

이 약은 사이토크롬 P450 대사효소를 유도하므로, 이 효소에 의해 대사되는 다음 의약품의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 따라서 다음 의약품과의 병용은 가능하면 피하고 부득이하게 병용 시에는 부작용 발현 여부 및 아래 사항에 주의해야 한다.

- 1) HIV 프로테아제 저해제(인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 암프레나비르 등) 등 항레트로바이러스제 (에파비렌트, 네비라핀, 데라비르딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 다디노신, 잘시타빈 등)과 병용시 이러한 항레트로바이러스제의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현될 수 있다.
- 2) 쿠마린계 항응고제(헤파린, 와파린 등), 면역억제제(사이클로스포린, 타크롤리무스수화물 등), 강심제(디기톡신, 디곡신, 메틸디곡신 등), 기관지 확장제(아미노필린, 폴린테오필린, 테오필린 등), 항부정맥제(아미오다론, 퀴닌, 디소피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항건련제(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 등), 항우울제(이미프라민, 아미트립틸린, 노르트리프틸린 등), 항암제(사이클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에토포시드 등)과 병용시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요하다.
- 3) 경구용 피임제(에치날레스트라디올, 데소게스트렐, 노르에치스테론, 레보노르게스렐 등)와 병용시 경구용 피임제의 효능 감소 및 부정성기출혈의 발현율이 증가할 수 있다.
- 4) 선택적으로 토닌제 흡수저해제 등 관련 항우울약(시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 세르트랄린, 네파조돈 등), 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용 시 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 및 수유부 투여에 관한 자료는 충분하지 않다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
- 3) 오용을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ♣ 이 설명서의 개정일자 2008년 09월 05일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.wooridulls.co.kr) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ♣ 이지드럭(ezdrug.kida.go.kr) 의약품 정보 참조 하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오

FMS 2008. 09. 05-01



제조의회사·판매원
우리들생명과학
www.wooridulls.co.kr

본사·공장: 경기도 화성시 향남읍 상신리 902-5
서 울: 서울특별시 강남구 삼성동 169-10
(소비자상담실) 080-080-4211



제조사
동성제약주식회사
본사: 서울특별시 도봉구 방학동 703-14
공장: 충남 아산시 둔포면 관대리 36-25