

# 이록손 정

(히드로코르티손)

## 【원료약품 및 분량】1정 중

히드로코르티손(KP) ..... 10mg

## 【성 상】백색의 원형정제

## 【효능・효과】

1. 내분비 장애 : 원발성 및 속발성 만성 부신피질기능부전증, 급성 부신피질기능부전증, 이급성 갑상선염, 갑상선 질환에 수반되는 악성 안구돌출증, 부신피질자극호르몬, 단독결립증, 특발성 저혈당증
2. 류마티스성 장애 : 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환 : 만성 류마티스관절염, 류마티스 열(류마티스성 심염을 포함)
3. 교원성 질환 : 홍반성 루푸스, 전신성 혈관염(대동맥증후군, 결절성 동맥주위염, 다발성 동맥염을 포함), 다발성 근염(피부근염), 강피증
4. 부종성 질환 : 신증 또는 신증후군
5. 알레르기성 질환 : 기관지 천식, 알물 및 기타 화학물질에 의한 알레르기, 중독(약전, 중독진을 포함), 혈청병
6. 중증 감염증 : 화학요법과 병용합니다.
7. 혈액 질환 : 용혈성 빈혈, 백혈병(급성 백혈병, 만성 골수성 백혈병의 급성전환, 만성 림프구성 백혈병, 피부 백혈병을 포함), 원발성 속속발성 과립구감소증, 혈소판 감소성 및 혈소판 비감소성 자반병, 재생불량성 빈혈
8. 위장관 질환 : 국한성 장염, 궤양성 대장염
9. 간 질환 : 만성 간염(활동형, 급성 재발형, 담즙 울체형, 단 일반적인 치료에 반응하는 간기능의 현저한 이상이 지속되는 난치성의 것에 한합니다), 간경변(활동형, 난치성 복수를 수반하는 것, 담즙울체를 수반하는 것).
10. 호흡기 질환 : 사르코이드증(양측폐문 림프절 종창만의 경우는 제외), 전격성 또는 파 증성 폐결핵(적절한 항결핵제와 병용합니다.) 결핵성 흉막염, 결핵성 복막염(은) 경우에도 항결핵제와 병용합니다.)
11. 뇌·신경 질환 : 뇌척수염(뇌염, 척수염을 포함, 단, 일차성 뇌염의 경우에는 두개내압 항진 증상을 보이고, 동시에 다른 제제로 효과가 불충분한 경우에는 단기간 사용), 말초 신경염, 다발성 경화증, 안면신경 마비
12. 피부 질환 : 습진·피부염(급성·아급성·만성 습진, 접촉성 피부염, 화폐상 습진, 자가감작성 피부염, 아토피성 피부염, 유·소아 습진, 비탈태선, 기타의 손가락 피부염, 음부 또는 항문습진, 이개 및 외이도의 습진, 피부염, 비전정부 및 비외주변의 습진, 피부염 등. 단, 중증에 이외에는 대량투여하지 않습니다.) 양진균(두드러기양 태선, 고정두드러기를 포함합니다. 단, 중증 예에 한합니다), 두드러기(만성의 경우 제외, 중증예에 한합니다)
13. 안과 질환 : 내안, 시신경, 안와, 안근의 염증성 질환에 대한 대증요법(포도막염, 맥락막염, 망막혈관염, 시신경염, 안와염증성위중양, 안와누두첨단부종후군, 안근마비), 외안부 및 전안부의 염증성 질환의 대증요법으로 점안제가 부적당한 경우(안건염, 결막염, 각막염, 원막염(強膜炎), 홍채모양체염)
14. 이비인후과 질환 : 급·만성 중이염, 침출성 중이염, 이관 협착증, 메니에르병 및 메니에르 증후군, 급성 감음성 난청, 알레르기성 비염, 화분증(고초염), 진행성 과저성비염, 식도의 염증(부식성 식도염, 내시경 사용 후) 및 식도 확장술 후, 이비인후과 영역의 수술후의 요법
15. 기 타 : 백독, 곤충독(중증의 벌레 물린 데를 포함), 악성 림프종(림프육종, 세방육종증, 호즈킨병, 피부세방증, 균상식육종) 및 유사질환, 호산성 육아증, 유방암의 재발 전이, 원인불명의 발열, 부신절제, 부신피질기능 부전환자에 대한 외과적 처치, 난관정형술 후의 유착방지, 난치성 구내염 및 설염(국소 요법으로 치유되지 않는 경우), 중증 소모성 질환의 전신상태 개선

## 【용법・용량】

히드로코르티손으로서 1일 10~120mg, 1~4회 분할 경구투여합니다. 연령, 중증에 따라 적절한 증감합니다.

## 【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
  - 1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
  - 2) 유효한 항균제가 없는 감염증, 전신 진균 감염증 환자(면역기능억제 작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있습니다.)
  - 3) 단순포진, 대상포진, 수두 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 투여하지 않는 것을 원칙으로 하지만 다음 환자에는 특히 필요한 경우에 한하여 신중히 투여합니다.
  - ① 결핵성 질환, 단순 포진성 각막염 환자(항염증 작용 및 면역억제 작용 등에 의해 감염증을 더욱 악화시키는 경우가 있습니다.)
  - ② 후낭하 백내장 환자(백내장을 더욱 악화시킬 수 있습니다.)
  - ③ 고혈압 환자(혈압을 상승시키는 경우가 있습니다.)
  - ④ 전해질이상 환자(전해질대사 장애작용에 의한 나트륨 저류, 부종, 칼륨배설증가에 의한 저칼륨혈증 등이 나타나는 경우가 있습니다.)
  - ⑤ 혈전증 환자(혈액응고력을 증가시키는 경우가 보고되었으므로, 혈전증을 더욱 악화시킬 수 있습니다.)
  - ⑥ 최근 장문합술을 받은 환자(단백이화작용에 의해 창상치료를 억제시키는 경우가 있습니다.)
  - ⑦ 소화성 궤양 환자(궤양을 더욱 악화시킬 수 있습니다.)
  - ⑧ 정신병 환자(정신병을 더욱 악화시킬 수 있습니다.)
  - ⑨ 중증 골다공증 환자(노중 칼슘배설의 증가, 장관으로부터의 칼슘 흡수억제 등에 의해 골다공증을 더욱 악화시킬 수 있습니다.)
  - ⑩ 녹내장 환자(안압을 상승시켜 녹내장을 악화시킬 수 있습니다.)
  - ⑪ 급성 심근경색을 일으킨 환자(심파열을 일으킨 보고가 있습니다.)
- 2) 감염증 환자(항염증작용 및 면역억제작용 등에 의해 감염증을 더욱 악화시키는 경우가 있습니다.)
- 3) 당뇨병 환자(당뇨병을 더욱 악화시킬 수 있으므로, 정기적으로 요당, 혈당 측정을 실시하는 것이 바람직합니다.)
- 4) 골다공증 환자(요중 칼슘배설의 증가, 장관으로부터의 칼슘흡수 억제 등에 의해 골다공증을 더욱 악화시키는 경우가 있습니다.)
- 5) 신부전 환자(배설이 저하되어, 작용이 증강되는 경우가 있습니다.)
- 6) 율혈성 심부전 환자(전해질대사장애작용에 의한 나트륨 저류, 부종, 칼륨배설 증가에 의한 저칼륨혈증 등이 나타나는 경우가 있습니다.)
- 7) 갑상선기능저하 환자(갑상선호르몬의 분비억제에 의해 갑상선기능저하를 더욱 악화시키는 경우가 있습니다.)
- 8) 간경변 환자(대사가 저하되어, 작용이 증강되는 경우가 있습니다.)
- 9) 지방간, 지방색전증 환자(지방의 저장작용에 의해 중상을 더욱 악화시키는 경우가 있습니다.)
- 10) 중증 근육력증 환자(단백질합성 억제에 의해, 사용초기에 중상이 일시적으로 악화되는 경우가 있습니다.)
- 11) 고령자
- 12) 당뇨병, 녹내장의 가족력이 있는 환자
- 13) 코르티코이드로 인한 근병증의 병력이 있는 환자
- 14) 비특이성 궤양성 대장염(천공, 농양 또는 기타 화농성 감염증이 유발될 수 있는 환자)
- 15) 게실성 환자

## 3. 부작용

다음 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 적절한 처치를 합니다.

- 1) 감염증 : 감염증의 유발, 악화, 오펜, 과민반응(증상 발현시 투여를 중지합니다.) 피부 반응의 억제 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 내분비계 : 속발성 부신피질기능부전(특히 외상, 수술, 질병 등의 스트레스 상태시), 당뇨병(잠재성 당뇨의 발현), 월경이상, 쿠싱증후군(월상안), 소아의 성장억제, 내당력 감소, buffalo hump 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계 : 천공과 출혈이 생길 수 있는 소화성 궤양, 궤양성 설사, 구역, 구토, 위통, 가슴쓰림, 복부팽만감, 궤양성 식도염, 구갈, 식욕항진 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 정신·신경계 : 정신장애, 우울증, 다행감, 불면, 두통, 어지러움, 경련, 치료 후 유두부종(가뇌종양)을 수반한 두개내압 상승 등이 나타날 수 있습니다.
- 5) 근·골격계 : 골다공증, 대퇴골 및 상완골 말단의 무균성 괴사, 근병증, 근육통, 관절통, 척추압박골절, 장골의 병리적 골절, 건파열 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 지질·단백질 대사 : 음성질소평형, 지방간 등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 혈액·전해질 : 부종, 혈압상승, 칼륨손실, 저칼륨성 알칼리혈증, 나트륨 저류, 체액저류, 감수성 환자에 있어서 율혈성 심부전 등이 나타날 수 있습니다.
- 8) 눈 : 연용에 의해 안압항진, 녹내장, 후낭하 백내장, 공평이나 바이러스에 의한 눈의 2차 감염을 초래할 수 있으므로 정기적으로 검사하는 것이 바람직합니다. 중심성 장액성 맥락막망막 등에 의해 망막장애, 안구돌출 등이 나타날 수 있습니다.
- 9) 피부 : 여드름, 다모, 색소침착, 피하 일혈, 자반, 선조, 가려움증, 발한 이상, 안면 홍반, 창상치유 지연, 알고 연약한 피부, 지방조직염, 점상출혈 및 반상출혈, 알레르기 피부염, 두드러기 등이 나타날 수 있다.
- 10) 혈액 : 백혈구 증가, 혈전색전증 등이 나타날 수 있습니다.
- 11) 기타 : 발열, 피로감, 스테로이드성 신증, 체중증가, 정자수 및 운동성의 증감등이 나타날 수 있습니다.

## 4. 일반적 주의

- 1) 이 약을 투여할 때 특히 적응증을 고려하여 다른 치료법으로 충분히 치료효과를 기대할 수 있으면 이 약을 사용하지 않는 것을 원칙으로 하고, 국소 요법으로도 충분한 경우에는 국소요법을 실시합니다.

- 2) 장기투여시 속발성 부신피질부전이 나타날 수 있으며, 투여 중지 후 수개월까지 계속될 수 있습니다. 장기투여 후 코르티코이드를 갑자기 중지하면 급성 부신피전, 가꿈 발열, 두통, 식욕부진, 무력감, 근육통, 관절통, 속증상 등이 나타날 수 있으므로 점진적으로 감량하는 등 특히 주의하며, 급단증상이 나타난 경우에는 즉시 재투여 또는 증량합니다. 장기투여 중 외상, 수술, 감염 등의 스트레스 발생시 일시적으로 투여량을 증가해야 하며, 장기투여 후 투여 중지상대인 경우에는 일시적으로 재투여해야 합니다.
  - 3) 투여 중에는 부작용의 출현에 대하여, 항상 충분한 배려와 관찰을 행하고, 또한, 환자를 스트레소로부터 벗어나도록 하고, 사고, 수술 등의 경우에는 증량하는 등 적절한 처치를 행합니다.
  - 4) 이 약을 투여하면 감염증의 증상을 때때로 불현화시키는 수가 있으며 또한 사용중에 또 다른 감염이 발생할 수도 있습니다. 코르티코이드 투여 중에는 감염을 국소화 시키는 능력과 저항력이 저하될 수도 있습니다.
  - 5) 이 약의 평균용량 또는 그 이상을 사용할 경우 혈압상승, 염과 수분의 저류, 칼륨 배설의 증가를 일으킬 수 있으나 과량투여시 이외에는 합성유도체로 인한 이런 작용이 나타날 염려가 없습니다. 음식물 섭취시 염제함과 칼륨보충이 필요할 수 있습니다. 모든 코르티코이드는 칼슘배설을 증가시킵니다.
  - 6) 코르티코이드 요법을 받는 환자는 생백신을 투여받으면 안되며, 신경학적 합병증의 가능성과 항체반응의 결핍으로 인하여 특히 고용량으로 코르티코이드를 투여중인 환자는 기타의 예방 접종도 하지 않아야 합니다.
  - 7) 면역억제제를 투여중인 환자(소아)는 건강한 사람(소아)보다 감염되기 쉽습니다. 예를 들어 수두나 홍역은 면역억제제인 코르티코이드를 투여한 환자에서 더 심각하거나 심지어 치명적인 결과를 일으킬 수 있습니다. 이러한 질환을 앓아 본적이 없는 성인 및 소아의 경우 이러한 것에 노출되지 않도록 특히 주의합니다. 만일 수두에 노출되면 3일~10일 이내 수두대상포진 면역글로불린(VZIG), 홍역에 노출되면 면역글로불린(IG) 같은 예방처치가 필요합니다. 수두가 발생되면 항바이러스약을 사용이 고려됩니다.
  - 8) 활동성 결핵 환자에 이 약의 투여는 전격성, 파종성 결핵에 한정되며 적절한 항결핵요법제와 병용투여합니다.
  - 9) 잠복성 결핵 환자 또는 튜베르쿨린 반응 양성 환자에게 코르티코이드를 투여할 경우 결핵이 재활성화될 수 있으므로 세밀한 관찰이 필요하며 장기연용할 경우에는 예방적 화학요법을 받아야 합니다.
  - 10) 장기치로서 위험도를 고려한 후 치료를 시작해야 하며, 부작용은 투여량, 투여기간과 상관성을 나타내므로 최소유효량을 되도록 단기간 투여합니다.
  - 11) 코르티코이드는 잠재적 아메바증을 활성화시킬 수 있으므로 열대지방을 다녀왔거나 원인불명의 설사 증세를 보이는 환자들에서 코르티코이드 요법을 계획하기 전에 잠재적 또는 활동적 아메바증을 치료하도록 합니다.
5. 상호작용
- 1) 다형성 심실빈맥을 일으킬 수 있는 약물(아스테미졸, 베프리달, 에리스로마이신 IV, 할로판트린, 펜타미딘, 스파르플록사신, 빈카민, 설토프리드)과 병용투여하지 않습니다.
  - 2) 다형성 심실빈맥을 일으킬 수 있는 항부정맥제(아미오다론, 디스파리돈, 퀴니딘, 소탈올)는 서맥, QT 간격 연장, 저칼륨혈증 등은 부정맥을 일으키는 원인이 되므로 신중히 투여합니다. 심실빈맥이 나타나면 항부정맥제 투여를 중지합니다.
  - 3) 바르비탈계 약물(페노바르비탈), 페니토인, 리팜피신, 카르바마제핀, 프리미돈, 아미노글루테치미드, 리파부틴과 병용투여에 의해 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 병용 투여시 용량에 주의합니다.
  - 4) 경구용 항응고제에 대한 코르티코이드 작용은 일정하지 않습니다. 코르티코이드와 항응고제와의 병용에 의해 항응고제의 작용이 증가 또는 감소되었다는 보고 있으므로 병용투여시 용량에 주의합니다.
  - 5) 비스테로이드성 소염제와 병용투여시 위장관 궤양의 위험을 증가시킬 수 있으며, 아스피린과 병용투여시 아스피린의 신장소용을 증가시켜 살리실산염의 혈중 농도를 감소시키거나 이 약을 중단했을 때 살리실산염의 독성을 증가시킬 수 있으므로 용량에 주의합니다. 특히 저프로트롬빈혈증 환자에서 이 약과 아스피린을 병용투여시 주의합니다.
  - 6) 경구용 혈당강하제(톨부타미드, 클로르프로파미드)와 병용투여시 이 약의 작용을 감약시키는 것이 보고되었으므로 용량을 조절하는 등 주의합니다.(이 약은 간장에서의 당생합성을 촉진하고 말초에서의 당 이용을 억제합니다.)
  - 7) 이노제(칼륨보존성 이노제는 제외), 암포테리신 B, 카르베노졸론, 안화제와 병용에 의해 저칼륨혈증이 나타날 수 있으므로, 자주혈중 칼륨농도를 검사하고 병용투여시 용량에 주의합니다.
  - 8) 디기탈리스 배당체와 병용투여시 부정맥, 저칼륨혈증과 관련된 독성이 증가할 수 있으므로 혈중 칼륨농도를 검사하고 경우에 따라서는 심전도 검사를 실시합니다.
  - 9) 이소니아지드와 병용투여시 이소니아지드의 혈중농도가 감소하므로 용량조절이 필요합니다.
  - 10) 제산제는 당질코르티코이드의 위장관 흡수를 방해하므로 투여간격을

- 을 2시간 이상으로 합니다.
- 11) 혈압강하제와 병용투여시 혈압강하효과를 감소시킬 수 있습니다.(나트륨 증가로 수분 정체 위험이 있습니다.)
  - 12) 알파인터페론과 병용투여시 인터페론의 활성을 억제할 수 있습니다.
  - 13) 클로로핀, 히드록시클로로핀과의 병용에 의해 근병성, 심근증 발생 위험이 증가할 수 있습니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 동물실험에서 기형발생 작용이 보고되어 있으며 태아의 성장지체, 연청이의 위험등의 증가, 태아의 뇌성장 및 발달에도 영향을 끼칠 수 있으며 임신 중에 코르티코이드를 투여한 모체에서 태어난 신생아의 경우 부신부전증을 일으킬 수 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
  - 2) 코르티코이드는 모유 중으로 이행될 수 있으므로 이 약 투여 중에는 수유를 중단합니다.
7. 소아에 대한 투여
- 1) 소아 및 청소년기에서 용량 관련 성장지체가 비가역적으로 나타날 수 있으므로 소아에 코르티코이드를 투여할 경우에는 최소용량을 투여해야 하며 발육성장에 관해 주의 깊게 관찰합니다.
  - 2) 장기투여한 경우 두개내압 항진증상이 나타날 수 있습니다.
8. 고령자에 대한 투여
- 고령자에 장기 투여한 경우, 감염증의 유발, 당뇨병, 골다공증, 고혈압, 후낭하 백내장, 녹내장 등의 부작용이 나타나기 쉬우므로 충분히 관찰하여 신중히 투여합니다.

#### 【포 장 단 위】 자사포장단위

【저 장 방 법】 차광밀폐용기, 15~30℃보관

【사 용 기 간】 제조일로부터 36개월

【제 조 자】 태극제약(주) / 경기도 화성시 향남면 상신리 907-4

【제조외의자】 이연제약(주) / 충북 진천군 덕산면 한천리 27-27

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변패·변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 1월 2일) 이후 변경된 내용은 [www.reyonpharm.co.kr](http://www.reyonpharm.co.kr) 이나 [ezdrug.kfda.go.kr](http://ezdrug.kfda.go.kr) 에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭([ezdrug.kfda.go.kr](http://ezdrug.kfda.go.kr)) 의약품 정보 참조

※ 고객상담실 : 080-221-2000(수신자부담)

작성년월일 : 2009. 1. 2



## 이연제약주식회사

본사: 서울 · 용산구 동빙고동 38-6  
 공장: 충북 진천군 덕산면 한천리 27-27  
 TEL. (02)793-5557,5374