

코 데 신 정

(Codecin Tab.)

분류번호

222

전문의약품

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

디히드로코데인타르타르산염(BP).....	5.0mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.5mg
di-메틸에페드린염산염(KP)	17.5mg
무수카페인(KP)	10.0mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

[성 상] 백색의 원형정제

[효능·효과] 기침, 가래

[용법·용량]

1. 성인 : 1회 2정, 1일 3회 식후 및 취침시 복용한다.
2. 소아용량 : 11세이상 15세미만 1~2정, 8세이상 11세미만 1정

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게 투여하지 말 것

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발진, 발열, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 3) 간장, 신장, 갑상선 질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 심장에 장애가 있는 사람, 혈압이 높은 사람 또는 고령자(염산페닐프로판올아민, 염산메톡시페나민, 염산메틸에페드린, 염산수도에페드린을 함유하는 제제)
- 5) 임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람

3. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 1) 용법, 용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음 약들과 동시에 복용하지 말 것
: 다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 4) 7세 이하의 소아는 시럽제를 복용시킬 것
- 5) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고 3개월 이상도 1세 미만의 유아에게는 부득이 한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것
- 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 기밀용기

[사용(유효)기한] 제조일로부터 36개월

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.
본설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참조하시기 바랍니다.

* 이 제품 설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.swpharm.com)의 제품정보 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관([http:// drug.mfds.go.kr](http://drug.mfds.go.kr))의 '의약품검색란'을 통해 확인하실 수 있습니다.

[설명문안 개정일] 2015. 08. 31



제조·판매원

성원애드코제약(주)

본사 : 서울특별시 강서구 허준로 217 302호(가양3동, 가양테크노타운)
Tel. 02)3665-2872(대) Fax. 02)3665-2874

공장 : 경기도 김포시 통진읍 가현로 182-4
Tel. 031)982-2872 Fax. 031)988-2873
<http://www.swpharm.com>