

산크만정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

아세트아미노펜(KP)	300mg
클로르록사존(KP)	250mg
첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호	

[성상] 주황색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

신경통, 근육통, 관절통, 요(허리)통, 염좌통(뺨 통증), 건통(어깨결림, 어깨통증), 근경련(근육경련), 근경직(굳음) 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제질환(여러 질환)

[용법·용량]

성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈 속)시를 피하여 복용한다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 클로르록사존에 과민증 환자
- 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자
- 3) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 복용 시 주의사항

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술, 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우

2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심한 간, 신장애(신장장애) 환자
- 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자
- 3) 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 부작용

- 1) 과민증 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출혈(피부에 검보라빛 얼룩점이 생기는 내부출혈), 요변색(소변색이 변함) 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아낙필락시스 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 간장 : 클로르족사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다.
- 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다.
- 4) 청신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우 투여한다.

7. 상호작용

알코올이나 중추신경계 억제제와 병용(함께 복용(사용))투여 시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여한다.

[저장방법] 밀폐용기, 상온(15~25℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

[날알모음포장(PTP)의 제조번호, 사용기한 보는 법]

예를 들어 "1201 20150101"로 표기된 경우, 앞 네자리 "1201"은 제조번호, 뒤 여덟자리 "20150101"은 사용기한 "2015년 01월 01일"을 각각 의미함.

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2012년 10월 18일

제조사 :



BioTechnology Origination
주비티오제약
경기도 이천시 부평읍 가신리 491-7
www.biopharm.com

판매자 :



한미메디케어(주)