

디메틴정

Dimetin Tab.

【원료약품의 분량】 1정 중

디메틴정(디메크로틴산 마그네슘).....50mg

【성상】 흰색의 원형당의정

【효능·효과】 소화불량, 구역, 구토 등의 증상치료

【용법·용량】 성인 : 1회 1정, 1일 3회 매 식전 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것. (경구제 및 주사제에 한함)
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
담관 폐색 또는 중증 간부전 환자
- 이상반응
 - 과량 투여시 설사증상이 나타날 수 있다.
 - 설사나 복부 통증이 나타날 경우 투여를 중지하고 의사나 약사와 상의한다.
 - 국내 시판후 조사 결과
국내에서 재심사를 위하여 623명을 대상으로 실시한 사용성적조사 결과, 이상반응 발현율은 0.80%(5/623명)로 보고되었고, 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 0.64%(4/623명)이었다. 약물유해반응은 설사 0.48%(3명), 복통 0.16%(1명)이었다. 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로는 인과관계와 상관없이 변비 1례가 보고되었다.
- 상호작용
현재 복용중인 다른 약물과의 상호작용을 피하기 위하여 의사나 약사와 상의한다.
- 저장상의 주의사항
어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 자사포장단위

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변색 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ♣ 이 설명서의 개정일자 2010년 08월 12일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지 (www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ♣ 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조 하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
DMG 2010.08.12-02



제조사
대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남원동 1056-16호
공장:경기도 화성군 화성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>



제조 의뢰자 · 판매원
우리들제약

www.wooridulpharm.com

본사 · 공장 : 경기도 화성시 향남읍 상산리 902-5
(소비자상담실) 080-080-4211