

각종 간질환 예방 및 개선제

리버파워 연질캡슐

KGMP적격업체 / 일반의약품 / 분류번호 : 391

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

원료약품의 분량 : 1캡슐 중

밀크시슬엑스(생규).....	100mg
티아민염산염(KP).....	4mg
리보플라빈(KP).....	4mg
피리독신염산염(KP).....	4mg
니코틴산아미드(KP).....	12mg
판토텐산칼슘(KP).....	8mg
시아노코발라민(KP).....	1.2μg
타르색소·적색40호, 청색1호	

성 상 : 갈색의 유상액이 들어있는 적자색의 장방형 연질캡슐

효능 · 효과 : 다음 질환의 보조치료 : 만성 간질환, 독성 간질환

용법 · 용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 복용하십시오.

치료 후 복용량을 1일 1~2캡슐로 줄이십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되어있지 않습니다.

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 설사

2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

4. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.

2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시키십시오.

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 100, 200캡슐

사용기간 : 제조일로부터 24개월

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 080-850-3611~2로 문의 하시거나 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) (의약품 검색) 에서 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자 : (주)셀트리온제약 충청북도 진천군 이월면 반지길 47-17

제조사 : 동방에프티엘(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 78(상신리 904-5)

판매원 :  **중근당** 계열회사 **경보제약**

첨부문서 개정 년월일 : 2014. 05. 08