

눈영양·안정피로 시력보호 및
눈의건조·아맹증 등 안과질환 예방·치료제

하이비플러스 연질캡슐



HAYBEE Plus Soft Capsules

눈은 오장육부의 정기를 나타내며 생활의 리듬을 조절하는 중요한 감각기관이며 지적인 정보의 중요 입수기관으로서 정보산업 사회에서 쉴 사이 없이 외계에 노출되는 현대의 가장 소중한 보배이므로 원활한 기능발휘를 위해서는 많은 보호를 받아야 합니다. 그러나 자연적인 노화현상에 의한 시력감퇴와 지나친 TV시청, 불량조명, 수험공부, 지속적인 근거리작업, 운전, 컴퓨터 업무, 오염된 대기 등 습관적·환경적인 요인에 의해 눈의 생명인 시력이 장애를 받기 쉽습니다.

하이비플러스연질캡슐은 일정량의 지용성 비타민 및 동물성 필수지방산의 총합체인 사육(Snake oil)과 동글로로필(Copper Chlorophyll) 외에 시력보호 및 개선효과를 가지는 레티놀팔미테이트유(Retinol Palmitate Oil), 에르고칼시페롤(Vitamin D)이 이상적으로 처방되어 있는 동물생약 배합제제로서 특히 눈의 피로가 심한 수험생이나 직장인과 갱년기 이후의 노인성 안과질환의 주요 원인인 안구건조증의 치료에 탁월한 효과를 나타내는 눈 영양제입니다.

【약리작용 및 특성】

- 하이비플러스연질캡슐**은 망막주위 시신경세포의 생체대사에 활력을 줌으로써 장시간 눈을 사용하는 수험생이나 운전자, 컴퓨터 사용자, 집중적이고 정밀한 업무에 종사하는 직장인 등에게 나타나는 눈의 피로와 각종 유해광선, 오염된 대기, 자외선 등으로 인한 눈의 건조감을 개선시켜 줍니다.
- 하이비플러스연질캡슐**은 시신경세포내의 시신경에 에너지를 공급하는 인산화 반응을 촉진함으로써 아맹증, 자연적인 노화현상에 의한 시력감퇴, 눈이 침침해지거나 따가운 듯한 증상, 눈물이 자주 나가거나 햇빛에서 눈을 잘 못 뜨는 증상, 시력이상으로 인한 두통 등과 같은 자각증상을 개선시켜 줍니다.
- 하이비플러스연질캡슐**은 체내 대사기능을 촉진시킴으로서 체력저하에 따르는 각종 무력증, 체력보강이 필요한 수험생, 임신, 수유기, 병중, 병후의 체력저하, 소아의 발육부진 등에 필수 불가결한 비타민 A, D를 공급하여 치아 및 골격의 형성을 돕습니다.

【원료약품의 분량】 (1연질캡슐 중)

사육(동물유래:Snake, 사용부위: 지방)	(생규)	296.7mg
동글로로필	(별규)	0.3mg
레티놀팔미테이트유	(KP)	2.0mg
(비타민 A로서 2,000 I.U)		
에르고칼시페롤	(KP)	0.2353mg
(비타민 D2로서 200 I.U)		
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸	(KP)	0.05mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필	(KP)	0.005mg
첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 피부)		
첨가제(타르색소): 청색 1호, 적색 40호		

【성 상】 연두색의 유상물질이 든 적갈색의 타원형 연질캡슐제

【효능·효과】

- 다음 증상의 완화 : 눈의 건조감
- 치골의 발육불량
- 아맹증(밤에 잘 못보는 증상)
- 구루병의 예방
- 다음 경우의 비타민A, D의 보급 : 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후), 체력저하시, 발육기, 노년기

【용법·용량】

15세 이상 성인 : 1일 1회 2캡슐, 7세 이상 - 15세 미만 : 1일 1회 1캡슐씩 복용한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관



제조발매원
영풍제약주식회사
인천광역시 남동구 철박로 333

【사용상의 주의사항】

1. 경 고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것.(비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우 : 피부(가려움), 소화기(오심(구역), 구토)
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성(임신 전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민A를 1일 10,000 IU 이상 섭취한 임부에는 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있다.)
- 3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. : 설사

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 것.

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고, 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관할 것.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서개정연월 : 2015년 06월

제품문의 : (032)812-8356