



대한민국

한국식품

안전관리원

일반의약품

분류번호 : 313

고함량 메가비타민 100

맥스케어

정

비타민은 미량 영양소로서, 충분히 섭취되지 않거나 한 종류라도 부족하게 되면 체내에서 일어나는 여러 가지 대사에 지장을 초래하여 질병이 유발될 수 있습니다. 특히 비타민 B군은 수용성이므로 많은 양을 섭취해도 체내에 저장되지 않아 매일 섭취하는 것이 좋습니다. 맥스케어정은 체내 여러 대사 과정에 필수적으로 쓰이는 비타민 B군을 고함량으로 함유하고 있습니다. 또한 지방과 콜레스테롤의 대사에 작용하는 콜린 및 이노시톨, 면역기능 향상과 성장·발달을 도와주는 아연이 이상적으로 처방되어 있어 성장기 어린이부터 노년까지 복용할 수 있는 고함량 비타민 B 복합 영양제입니다.

【특징점】

- 고함량 비타민 B군 복합제**
맥스케어정은 인체 대사에 필수요소로 작용하는 8가지 비타민 B군에 고함량으로 함유되어 있어, 흡연, 음주, 과도한 운동, 스트레스, 당뇨 등으로 체내 소모량이 증가된 분들의 비타민 B군 결핍에 의해 나타나는 신경손상, 운동능력저하, 만성 통증, 만성 피로를 효과적으로 개선시킵니다.
- 신경비타민(B₁, B₆, B₁₂) 함유**
맥스케어정은 통증을 경감시키고 피로물질의 분해를 촉진하는 비타민 B₁, 만성 통증을 유발하는 신경물질을 감소시키는 B₆, 신경세포를 복구하고 통증 감각 능력이 강력한 B₁₂를 고함량으로 함유하여, 기존 종합비타민제로 효과가 약했던 신경성 피로로 인한 신경통, 근육통, 관절통 및 어깨결림, 요통, 눈의 피로 등의 증상 완화 효과가 뛰어납니다.
- 성인병 예방 효과**
맥스케어정은 비타민 B군 외에도 콜린 및 이노시톨이 함께 처방되어 있습니다. 콜린, 이노시톨은 지방과 콜레스테롤의 대사에 작용하여 성인병 예방 효과가 있습니다.
- 성장·발달을 도와줌**
맥스케어정은 단백질 합성, 면역기능 향상 효과 및 성장·발달을 도와주는 아연이 함께 처방되어 있어 성장기 어린이와 청소년에게 도움을 줍니다.

【성분·함량】(1정 중)

질산치아민(케이.피.)	100mg
리보플라빈(케이.피.)	100mg
니코틴아미드(케이.피.)	100mg
판토텐산칼슘(케이.피.)	100mg
엽산피리독신(케이.피.)	100mg
엽산(케이.피.)	500μg
시아노코발라민(케이.피.)	500μg
비오틴(유.에스.피.)	500μg
주석산수소콜린(디.에이.비.)	100mg
이노시톨(케이.피.)	100mg
산화아연(케이.피.)	50mg
(아연으로서)	40.17mg

【성상】

담황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후의 체력저하시
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 비타민 B₁(질산치아민) : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등) 등의 완화, 각기, 눈의 피로
 - 비타민 B₂(리보플라빈), 비타민 B₆(엽산피리독신) : 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염 등의 완화
- 아연의 보급

【용법·용량】

12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 12개월 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부, 수유부
 - 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장에 환자
 - 저단백혈증 환자
- 부작용
 - 이 약의 투여에 의하여 구역, 구토, 묽은 변, 위장장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucosetolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 상호작용
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 이 약을 투여할 경우에는 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제, 레보도파 등의 약물과 병용투여하지 마십시오.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.
- 임상검사치에의 영향

요를 황색으로 변화하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】

- 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 3년
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자 피해보상 규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
신일제약(주)



분리배출

설명서 작성년월일 : 2007. 08. 20