

조페닐정

7.5/15/30밀리그램 (조페노프릴칼슘)

전문의약품
분류번호 214

[원료약품 및 분량]

7.5mg

이 약 1정(52 mg)중
주성분 조페노프릴칼슘(별규)7.5mg
(조페노프릴로서 7.2mg)

15mg

이 약 1정(104 mg)중
주성분 조페노프릴칼슘(별규)15.0mg
(조페노프릴로서 14.3mg)

30mg

이 약 1정(208 mg)중
주성분 조페노프릴칼슘(별규)30.0mg
(조페노프릴로서 28.7mg)

[성상]

7.5mg

백색 원형의 양면이 볼록한 필름코팅정

15mg

흰색 타원형의 한면에 절취선이 있는 필름코팅정

30mg

백색 장방형의 양면에 절취선이 있는 필름코팅정

[효능효과]

1.고혈압

경도 내지 중등도의 본태성 고혈압

2.급성 심근경색

심부전의 증상 또는 징후 유무에 관계없이, 혈액동력학적으로 안정하고 혈전용해 치료를 받지 않은 환자

[용량용법]

:이 약은 식사와 무관하게 복용할 수 있다. 용량은 환자의 반응에 따라 조절해야 한다. 순응도 개선을 위해 가능하면 매일 같은 시간(예:아침)에 복용할 것이 권장된다.

1.고혈압

:용량 조절은 다음 용량을 투여하기 직전의 혈압 측정 후에 결정되어야 한다. 용량은 4주 간격으로 증가되어야 한다.

1) 체액 또는 염류 부족이 없는 환자

1일 1회 15mg으로 투여를 시작한다. 이 약의 권장용량은 1일 1회 30mg이며, 혈압조절이 잘 되지 않는 경우 1일 최대 60mg을 1회 또는 2회로 나누어 투여하거나, 이 노제를 병용투여할 수 있다.

2) 체액 또는 염류 부족이 의심되는 환자

초회 투여시 고위험군 환자("3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것" 참고)에서 저혈압이 발생할 수 있다. ACE 저해제 투여를 위해서는 체액 및/또는 염류 부족을 치료하고, ACE 저해제 투여 2~3일전부터 이노제의 투여를 중단한 후 1일 15mg의 용량으로 투여를 시작한다. 만약 위의 치료가 불가능한 경우, 1일 7.5mg으로 투여를 시작한다. 중증의 급성 저혈압 고위험군 환자인 경우 초회투여 및 용량증량시 최대 혈압저하효과가 관찰될 때까지 병원에서 주의하면서 관찰한다. 이는 과도한 저혈압으로 인해 심근경색 또는 뇌혈관계 사건이 일어날 수 있는 협심증 또는 뇌혈관계질환환자에도 적용된다.

3) 신부전 환자 및 투석환자

이 약은 경증의 신부전(크레아티닌 청소율)45mL/min)을 동반한 환자에서는 용량조절이 필요하지 않다. 중등도에서 중증 신부전 환자(크레아티닌 청소율 <45mL/min)의 경우 7.5mg으로 투여를 시작한다. 투석을 받고 있는 환자인 경우, 3.75mg으로 투여를 시작한다.

4) 고령자

정상 신기능을 가진 고령자의 경우 용량조절이 필요하지 않으나, 크레아티닌 청소율이 감소된(45mL/min 미만)고령자는 1일 1회 7.5mg으로 투여를 시작한다.("3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것"참고)

5) 간부전환자

경증에서 중등증의 간부전 환자의 경우 7.5mg으로 투여를 시작한다. 중증 간부전 환자인 경우 이 약을 투여해서는 안된다.("2. 다음 환자에는 투여하지 말 것"참고)

1.급성 심근경색

이 약 투여시 환자는 질산염제, 아스피린, 베타차단제와 같은 적절한 표준치료를 받아야 한다.

급성 심근경색의 증상 발생 후 24시간 이내에 다음과 같이 투여를 시작하며 6주간 치료를 지속한다.

1일 및 2일 : 12시간마다 7.5mg

3일 및 4일 : 12시간마다 15mg

5일 이후 : 12시간마다 30mg

치료 시작 후 또는 심근경색 후 첫 3일 동안 낮은 수축기 혈압(≤ 120 mmHg)이 관찰되는 경우 용량을 증량해서는 안 된다. 저혈압(≤ 100 mmHg)이 관찰되는 경우 최종 내약용량으로 치료를 지속한다. 중증 저혈압 환자(최소 1시간 간격으로 2회 측정된 수축기혈 혈압이 90mmHg 보다 낮은 경우)인 경우 이 약의 투여를 중단하여야한다. 이 약을 6주간 투여한 후 환자의 상태를 재평가 하여, 좌심실 기능부전 또는 심부전의 징후가 없다면 투여를 중단하여야 한다. 만약 이러한 징후가 있는 경우 이 약의 투여가 장기 간 지속될 수도 있다.

1) 고령자

이 약은 75세 이상의 심근경색 환자에서는 신중히 투여하도록 한다.("3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것" 참고)

2) 신부전 환자 및 투석환자

이 약은 신부전 또는 투석중인 심근경색환자에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로, 투여해서는 안된다. ("2. 다음 환자에는 투여하지 말 것" 참고)

3) 간부전 환자

이 약은 간부전을 동반한 심근경색환자에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로, 투여해서는 안된다. ("2. 다음 환자에는 투여하지 말 것" 참고)

[사용상의 주의사항]

1.경고

- 이 약과 같은 ACE 저해제 투여 중 혈관신경성 부종이 나타나면 약의 투여를 즉시 중단해야 한다. 혀, 인두, 성문 등에 혈관신경성 부종이 발생할 수 있으며, 생명을 위협하는 혈관신경성 부종에 대한 응급치료는 ECG와 혈압을 모니터링하면서 즉각적으로 epinephrine을 피하 투여하거나 천천히 정맥투여를 하는 것이다. 그 후 적어도 12~24시간은 입원치료를 받아야 하며, 증상이 완전히 사라진 후에 퇴원해야 한다.

2.다음 환자에는 투여하지 말 것

- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 ACE 저해제에 과민증 환자
- ACE 저해제로 인한 혈관신경성 부종의 병력이 있는 환자
- 유전성/특발성 혈관 신경성 부종 환자
- 대동맥판협착증, 비후성심근병증 또는 폐쇄성 박출장애 환자
- 아크릴로니트릴실리콘나트륨박을 이용한 혈액투석을 시행중인 환자(아나필락시양 증상이 나타날 수 있다.)
- LDL 분리반출법 치료를 받고 있는 고지혈증 환자(테스트란황산콜레스테롤을 사용한 LDL 분리반출법을 시행중인 환자)(속이 나타날 수 있다.)
- 원발성 고알도스테론혈증 환자
- 양측성 또는 단일 신장에서의 편측성 신동맥 협착이 있는 환자
- 중증 간부전을 동반한 고혈압환자
- 간부전을 동반한 급성심근경색 환자
- 신부전을 동반한 급성심근경색 환자
- 혈액투석중인 급성심근경색 환자
- 신장이식 후 환자
- 임부, 수유부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 소아
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency)또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안된다.

3.다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 고령자

- 저혈압 : 이 약은 다른 ACE 저해제와 마찬가지로 특히 초회투여시 심각한 혈압저하를 일으킬 수 있다. 증상성 저혈압은 합병증이 없는 고혈압환자에서는 드물게 발생하며, 이노제 치료, 염제한 식사, 투석, 설사 또는 구토에 의해 체액이 부족한 환자에서 발생할 가능성이 높다. 신부전의 동반과 상관없이 주로 중증 심부전환자에서 저혈압의 발생이 보고되었다. 고용량 투르게 이노제 투여 환자, 지나트륨결핍 환자 또는 기능성신부전환자에서 발생할 가능성이 높다. 이러한 환자들의 경우 입원하여 의사의 세심한 관찰 하에 저용량으로 치료를 시작하고 신중히 증량하여야 한다.

이 약으로 치료를 시작 시 되도록 이노제의 투여를 중단하여야 한다. 이는 심한 저혈압이 심근 경색 또는 뇌혈관 사고를 일으킬 수 있는 협심증 또는 뇌혈관 질환 환자에도 적용된다. 만약 저혈압이 발생한 경우에는 환자를 바로 눕힌 후, 생리식염수야액을 정맥투여하여 체액을 보충하도록 한다.

- 급성심근경색시의 저혈압 : 이약은 혈관확장제로 치료 후 추가적으로 심각한 혈액학적 저하가 일어날 수 있는 수축기 혈압 100mmHg 미만인 환자 또는 심인성 쇼크가 있는 급성 심근경색 환자에서는 사용하지 않는다. 이 약은 급성 심근경색 환자에서 심한 저혈압을 일으킬 수 있다. 저혈압이 지속되는 경우(수축기 혈압이 1시간 이상 90mmHg 미만인 경우) 이 약의 투여를 중단한다. 이 약은 급성 심근경색이후의 중증 심부전 환자에서 혈액학적으로 안정한 경우에만 투여하여야 한다.

- 심부전환자 : 이 약은 신부전 환자에서 용량 감소가 필요한 경우가 있으므로 주의하여 사용해야 하며, 치료동안 신기능에 대한 면밀한 관찰이 필요하다. 주로, 중증 심부전 또는 신동맥 협착을 포함하여 신장 질환이 있는 몇몇 환자에서 ACE 저해제의 투여와 관련된 심부전이 보고되었다. 명백한 신 질환 병력이 없는 환자에서 이 약을 이노제와 병용투여 한 경우 혈중 요소 및 크레아티닌 농도의 상승이 보고되었다. ACE 저해제의 용량 감소 또는 이노제의 투여 중단이 필요할 수 있다. 치료 시작 후 처음 몇 주간 신기능을 면밀하게 관찰할 것이 권장된다.

- 호중성백혈구감소증/무과립구증 : 호중성백혈구감소증의 위험은 용량과 형태에 관련이 있으며 환자의 임상상태에 따라 결정된다. 이는 합병증이 없는 환자에서는 거의 발생하지 않지만, 전신성 홍반성 낭창, 피부경화증과 같은 골관절 혈관질환 및 면역억제제 요법을 받는 환자의 경우 신부전 환자와 같은 정도로 발생할 수 있다. 이는 ACE 저해제 투여를 중단한 후에는 회복된다.

- 고칼륨혈증 : 특히 신부전 및/또는 심부전이 환자에서 ACE 저해제 투여시 고칼륨 혈증이 발생할 수 있다. 칼륨 보충제 또는 칼륨보존성 이노제는 혈장 칼륨농도를 유의하게 증가시키므로 일반적으로 권장되지 않는다. 만약 이러한 약물들과의 병용투여가 필요한 경우에는 혈청 칼륨농도를 자주 모니터링하여야 한다.

- 단백뇨증 : 단백뇨는 특히 이미 신부전이 있거나, 상대적으로 고용량의 ACE 저해제를 복용 중인 환자에서 발생할 수 있다.

4.이상반응

*임상연구 중 이 약 투여군에서 보고된 이상반응은 다음과 같다. 신체기관별로 나열하였으며, 다음과 같이 빈도를 표시하였다 : 매우 자주 (10%이상), 자주(1%이상~10% 미만), 때때로(0.1% 이상~0.1% 미만), 매우 드물게(0.01% 미만)

전신	
자주	피로
때때로	허약
위장관계	
자주	구역/구토
근신경계 및 결합조직	
때때로	근육 경련
신경계	
자주	어지러움, 두통
호흡계, 흉곽 및 종격	
자주	기침
피부 및 피하조직	
때때로	발적
드물게	혈관부종

ACE 저해제 투여와 관련하여 관찰된 이상반응은 다음과 같다.

- 1) 심혈관계 : 이 약 투여 초기 또는 용량 증가 후 종종 저혈압이 발생하였다. 이는 주로 고위험군 환자("3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것" 참고)에서 발생하였다. 어지러움, 무력감, 시야장애, 드물게 의식장애(졸도)와 같은 증상이 발생할 수 있다.
빠른맥, 두근거림, 부정맥, 협심증, 심근 경색, 일시적 허혈성 발작 및 뇌출혈이 저혈압과 관련되어 ACE 저해제를 투여중인 환자에서 개별적으로 보고되었다.
매우 드물게, 말초 부종, 기립성 저혈압 및 흉통이 보고되었다.
- 2) 근골격계 : 때때로 근육통 및 근육경련이 발생할 수 있다.
- 3) 신장 : 신부전이 발생하거나 악화될 수 있다. 급성 심부전이 보고되었다.
- 4) 호흡기계 : ACE 저해제가 다수의 환자에서 기침을 유발한다는 보고가 있다. 드물게 호흡곤란, 부비동염, 비염, 설염, 기관지염 및 기관지 연축이 보고되었다. 안면부, 구인두부 조직 등의 환자 국소부위의 혈관신경성 부종 발생과 ACE 저해제가 관련된 바 있었다. 상기도를 포함하는 혈관신경성 부종이 치명적인 기도폐색을 야기한 단독 사례가 있었다.
- 5) 위장관계 : 때때로 구역, 메아름, 구토, 설사, 변비, 입안마름증이 발생할 수 있다. 담즙울체성 황달, 간염, 췌장염 및 장폐색의 개별사례가 ACE 저해제와 관련성이 있는 것으로 보고 되었다.
- 6) 피부, 부속기관 : 때때로 발진, 가려움, 두드러기, 다형홍반, 스티븐-존슨 증후군, 독성 표피 괴사증, 건선성 발진, 원형탈모증과 같은 알려지지와 과민성반응이 일어날 수 있으며 발열, 오육통, 관절통, 호산구증가증 및/또는 ANA 적정량증가를 수반할 수 있다.
- 7) 신경계 : 때때로 두통, 어지러움, 피로감, 드물게 우울증, 감정변화, 수면장애, 감각이상, 발기부전, 군열장애, 착란, 이명, 흐린 시력, 미각장애
- 8) 임상검사치 : 특히 신부전, 종종 신부전, 신혈관 고혈압이 있는 경우, 혈장 요소, 혈장 크레아티닌이 증가할 수 있으며, 약물 중단시 정상으로 회복된다. 몇몇 환자에서 해모글로빈, 헤마토크릿, 혈소판, 백혈구수의 감소가 보고되었다. 이것은 무과립구증, 범혈구감소증을 포함한다. Glucose-6-phosphate dehydrogenase 결핍환자에서 용혈성빈혈의 보고가 있었다. 간효소와 빌리루빈의 혈청 농도 증가가 보고되었다.
- 9) 전신 : 땀의 증가, 얼굴이 붉어짐, 폐노이상이 발생할 수 있다.

5.일반적주의

- 1) 투석 : 고속 아크릴로니트릴설폰산나트륨막을 이용한 투석을 하는 환자에게 ACE 저해제를 투여한 경우 안면부종, 흉조, 저혈압 및 호흡곤란과 같은 아니필락시양 반응이 투석 시작 후 수 분 이내에 나타날 수 있다. 이러한 환자들에게는 다른 종류의 투석막 또는 다른 계열의 고혈압 약을 사용할 것이 권장된다.
이 약은 혈액투석 중인 심근경색환자에서의 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로, 이러한 환자에게는 투여하지 않는다.
- 2) LDL 분리반출법 : 텍스트란황산셀룰로오스를 이용하여 LDL 분리반출법 치료를 받고 있는 환자에 ACE 저해제를 투여한 경우 아크릴로니트릴설폰산나트륨막을 이용한 투석을 하는 환자에서 발생한 이상반응과 유사한 반응이 관찰되었다. 따라서 이러한 환자에서는 다른 계열의 항고혈압약을 사용할 것이 권장된다.
- 3) 탈감작 또는 곤충에게 물린 후의 아니필락시양 반응 : 드물게 탈감작 중 또는 곤충에게 물린 후에 ACE 저해제를 복용한 환자에서 생명을 위협하는 아니필락시양 반응이 발생하였다. 이는 매 탈감작 전에 ACE 저해제 복용을 일시적으로 중단함으로써 예방될 수 있다.
- 4) 기침 : 이 약의 투여동안 마른기침이 발생할 수 있으나, 이 약 투여를 중단한 후에 소실된다.
- 5) 수술/마취 : ACE 저해제는 수술 또는 마취중인 환자에서 저혈압 효과를 증가시키거나, 저혈압성 쇼크를 일으킬 수 있다. 따라서 혈액량을 증량하거나 필요시 안지오텐신 II를 투여하는 등 수술전이나 수술도중 적절한 대응조치를 해야 한다.
- 6) 건선 : ACE 저해제는 건선환자의 경우 주의하여 투여되어야 한다.

6.약물상호작용

- 1) 병용하지 말 것
 - ACE 저해제 복용중에 특정한 고투과막 (예, 아크릴로니트릴설폰산나트륨막)을 이용하여 투석 또는 혈액 여과를 하거나 텍스트란황산셀룰로오스를 이용하여 LDL 분리반출법을 하는 경우 심각한 아니필락시양 과민반응이 일어날 수 있다. 따라서 이 약과 이러한 용진하를 띤 투과막과의 병용을 피해야 한다.
- 2) 병용투여가 권장되지 않는 것
 - 혈청칼륨을 상승시키는 약물(스피로놀락톤, 아미로라이드 및 트리암테네 등의 칼륨 보존성 이뇨제, 칼륨보급제 등)을 병용 투여하는 경우에는 고칼륨혈증이 나타날 수 있다. 이런 약물과 병용 투여시 혈청 칼륨 농도를 신중히 모니터링한다.
- 3) 병용시 주의할 요하는 것
 - 이뇨제 : 이뇨제를 투여받고 있는 환자와 특히 체액 및/또는 염류 부족 환자에서 ACE 저해제로 치료개시 후 과도한 혈압저하가 발생할 수 있다. 추가적인 용량 증량이 주의하여 투여하여야 한다. 또한, 이뇨제 치료를 같이 받는 환자는 혈청내 나트륨의 농도를 정기적으로 모니터링해야 한다.
 - 리튬 : ACE 저해제와 리튬을 병용투여하는 경우에는 리튬 독성의 위험이 있으므로 혈중 리튬 농도를 신중히 모니터링하고 용량을 조절한다. (리튬의 배설을 감소시켜 혈중 리튬농도가 증가한다.)

- 교감신경흥분제: 이 약의 혈압강화작용이 감소될 수 있으므로, 주의깊게 혈압을 모니터링해야 한다.
- 마취제: ACE 저해제는 특정 마취제의 혈압저하효과를 증가시킬 수 있다.
- 마약성/항정신병약: 기립성 저혈압이 발생할 수 있다.
- 항고혈압약물: 베타 차단제, 알파 차단제 및 이노제는 ACE 저해제의 혈압저하효과를 증가시킬 수 있다.
- 시메티딘: 저혈압의 위험을 증가시킬 수 있다.
- 시클로스포린: ACE 저해제와의 병용투여로 신부전의 위험을 증가시킨다.
- 알로푸리놀: ACE 저해제와의 병용투여로 과민반응의 위험이 증가된다. 다른 ACE 저해제와의 병용투여에 의해 백혈구 감소증의 위험이 증가된 보고가 있다.
- 인슐린 또는 경구용 혈당강화제: ACE 저해제와의 병용투여로 저혈당의 위험이 증가한다.
- 세포중식억제제, 면역억제제, 전신성 부신피질호르몬제 또는 프로카인아미드: ACE저해제와의 병용투여로 백혈구감소증의 위험이 증가된다.

4) 기타 고려되어야 할 약물

- 비스테로이드성 소염제: ACE 저해제에 의한 혈압저하효과를 감소시킬 수 있다. 또한 비스테로이드성 소염제와 ACE저해제의 병용투여로 신기능은 저하되고 혈청 칼륨 농도는 증가할 수 있다. 이 효과는 가역적이며, 특히 신기능이 손상된 환자에서 발생한다.
- 제산제: ACE 저해제의 생체이용율을 감소시킨다.
- 알코올: 혈압저하효과를 증가시킨다.
- 음식: 이 약의 주성분(조페노프릴 갈슘)의 흡수속도를 감소시키거나 흡수량을 감소시키지 않는다.
- 기타 약물: 시토크롬 P450 효소에 의해 대사되는 다른 약물과 조페노프릴과의 상호작용에 관련된 임상자료는 없다. 그러나 in vitro 실험에서 사이토크롬450 효소에 의해 대사되는 약물과 조페노프릴과 상호작용의 가능성은 없는 것으로 나타났다.

7.임부, 수유부에 대한 투여

이약은 임부 및 임신 가능성이 있는 가임기 여성에게는 투여해서는 안된다.

임신 제2기 및 제3기 태아에서의 ACE 저해제 노출은 신생아에 저혈압, 신부전, 안면 또는 두개골 기형 및/또는 사망과 관련이 있다. 태아의 신기능 저하에 의한 양수과 소증으로 태아사지경축, 두개안면변형, 폐형성부전, 발육형성부전 등이 나타날 수 있다. 자궁 안에서 ACE저해제에 노출된 영아는 저혈압, 림프 및 고칼륨혈증에 대하여 면밀히 관찰되어야 한다. 림프는 혈압 보정 및 신장 관류로 치료되어야 한다.

임신 제1기에 ACE 저해제의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여해서는 안된다.

ACE 저해제를 반드시 투여해야 하는 경우에는 임신해서는 안된다. 만약 ACE 저해제를 복용중에 임신이 된 경우 약물 투여를 즉각 중단하고, 태아에 대한 잠재적인 위험에 대해 알려야 한다. 이 약은 모유를 통해 배설되므로 수유부에게 투여해서는 안된다.

8.소아

이 약은 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로, 투여해서는 안된다("2 다음환자는 투여하지 말 것")참고

9.운전 및 기계조작상의 주의

1)이 약의 운전능력에 대한 영향에 관한 연구는 없다. 운전 또는 기계조작시 때때로 졸음, 현기증 또는 피곤함이 발생할 수 있다는 사실을 주지시켜야 한다.

10.과량투여시의 처치

이 약의 과량투여시 저혈압, 쇼크, 혼미, 느린맥, 전해질 불균형, 신부전이 일어날 수 있다. 이 약을 과량투여한 경우, 가능한면 환자를 중환자실에서 면밀한 모니터 하여야 한다. 혈청 전해질 및 크레아티닌은 자주 모니터링하여야 하며, 증상의 특성과 정도에 따라 치료가 결정되어야한다. 과량투여가 일어난 시점이 오래지 않았다면 위세척과 흡착제 및 활성탄트립의 투여로 흡수를 막을 수 있다. 저혈압이 발생한 경우에는 환자를 쇼크자세로 유지시키고, 혈압 증강제의 적절한 사용 및/또는 안지오텐신 II 치료 가 고려되어야 한다. 느린맥 또는 과도한 미주신경 반응은 아트로핀으로 치료하며, 심장박동조절장치(pacemaker)의 사용이 고려될 수 있다.

[저장방법]

기밀용기, 실온보관

[사용기간]

포장결면의 사용기한 참조

[포장단위]

28정

의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 하십시오.

첨부문서를 보관하십시오.

본 의약품은 KGMP품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한 이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 재 경부고시 소비자피해 보상 규정에 의거, 구입처를 통하여 교환 환불 받을 수 있습니다.

** 이 첨부문서의 개정년월일(2013.04.01) 이후 변경된 내용은 www.menariniapac.co.kr이나 02)2037-7300 에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

제조사

A. Menarini Manufacturing Logistics and Service SRL Campo di Pile, 67100 L' Aquila, 이탈리아

수입자

한국메나리니(주)

서울시 강남구 테헤란로 411 성담빌딩 12층

소비자상담실 02-2037-7300