

알레르기성질환 치료제

리마진[®]-S 캡슐

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※제품에 대한 기타 자세한 사항은 이지드레(<http://ezdrug.kidago.kr>)-(정보
마당)-(의약품동정부)에서 확인할 수 있습니다. 개정일: 2009. 12. 31

일반 의약품
분류번호 : 149

알레르기

피부염

습진

두드러기

구각(구순)염

약물중독

알레르기성질환 치료제

리마진[®]-S 캡슐

10캡슐

제조원: 건강을 지키는 사람들로
MIRAE 미래 제약주식회사
MIRAE PHARM KOREA CO., LTD
경기도 안성시 신소원동 137번지

정부공인
KGMP
우수약품을 지정업체

알레르기성질환 치료제

RIMAGIN[®]-S

원료약품 및 그 분량 : 1캡슐(600mg) 중

시호가루(별규)	50mg
작약가루(약전)	50mg
택사가루(약전)	100mg
저령가루(제이피)	75mg
복령가루(약전)	75mg
창출가루(약전)	75mg
게피가루(약전)	35mg
클로르페니라민말레산염(약전)	2mg
피리독신염산염(약전)	5mg
리보플라빈(약전)	2.5mg
티아민질산염(약전)	1.5mg
니코틴산아미드(약전)	2.5mg
판토텐산칼슘(약전)	5mg
동물유래성분 : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)	

성상
갈색 분말이 충전된 상하 녹색의 경질 캡슐제

효능·효과

알레르기성 질환, 담마진(두드러기), 자가중독, 알콜, 니코틴 등의
약물중독, 피부염, 습진, 한진(땀띠), 설염(허염), 구각염(입꼬리염),
구순염(입술염)

용법·용량

1회 성인 2캡슐, 15세~8세 1캡슐을 1일 2회 복용

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

① 이 약에 과민성인 환자
② 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성
(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp
lactase deficiency) 또는 포도당- 갈락토오스 흡수장애
(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있
는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 부작용

① 가벼운 졸음, 일과성(한번 나타나고 없어지는) 자궁통 또는 작열
감(화끈감), 구갈(목마름), 구역, 구기(메스꺼움), 불안, 발한(땀이 남)
및 약간의 혈압강하 등을 일으킬 수 있으며 대량 투여시 급성중독
(환각 및 경련)을 일으킵니다.
② 전해질대사 : 장기 연용(계속 복용)에 따른 저칼륨혈증, 혈양상
승, 나트륨 체액의 저류(쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스
테론증이 나타날 수 있으므로 충분한 관찰을 하여 이러한 증상이
나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
③ 일반적 주의 : 이 약의 복용 중 자동차운전 및 위험한 기계조작
등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 하십시오.

포장단위 자사포장단위 (주위-부작용)

저장방법 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

소비자상담일 031)672-3431 www.miraepharmkorea.co.kr