

알부겐[®] 연질캡슐

알부겐은 보다 활기찬 신체를 위한 고기능 종합영양제입니다.

자양강장과 항산화 효과가 우수한 로알젤리 및 피로회복, 혈액순환 작용이 우수한

비타민 B군, C, E, 를 함유하고 있어 자양강장, 혈액순환 개선에 탁월한 효과를 보입니다.

체력이 저하되어 기운없고 피로하신 분들, 장, 노년기에 접어들면서 활력이 떨어진 분들이 복용하시면 좋습니다.

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품의 분량] 1캡슐 중

로알젤리 (식품의약품청고시)	20.0mg
(10-히드록시-2-데세노인산으로서 0.8mg)	
토코페롤아세테이트(약전)	45.0mg
(비타민 E로서 45.0 IU)	
아스코르브산(약전)	100.0mg
타이민염산염(약전)	15.0mg
리보플라빈(약전)	2.0mg
파리독신염산염(약전)	5.0mg
시아노코발라민(약전)	0.012mg
니코틴아미드(약전)	40.0mg
쿵기름(약전)	711.0mg
건조난분말(별구)	100.0mg
황납(약전)	37.0mg
레시틴(식채)	25.0mg
젤라틴(약전)	248.31mg

농글리세린(약전)	77.78mg
소르비톨(0%(비결정성)(영국약전)	89.75mg
에칠바닐린(NF)	적량
산화티탄(약전)	적량
첨가제(타르색소):적색40호, 청색5호, 황색5호	

[성상] 황색의 유상물질이 든 초콜렛색의 장방형 연질캡슐입니다.

[효능·효과]

- 다음의 경우의 비타민B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력 저하시 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음증상의 완화: 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증
- 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등의 완화) - 각기, 눈의피로

[용법·용량] 1회 1캡슐, 1일 1~3회 복용 하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

로알젤리가 함유된 제제사용으로 인하여 천식 및 심각한 알레르기 증상등의 이상반응이 나타났다는 외국의 보고가 있으므로 천식 및 알레르기 환자는 복용하지 마십시오.

2. 다음의 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3개월 미만의 영아
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의 하십시오.)

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 과수산노증 환자(hyperoxaluria : 노 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 임부 · 수유부
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지장대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 이상반응

- 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
: 위부불쾌감, 설사, 붉은 변, 변비, 발적, 구역, 구토
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 파리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
- 복합산이 부족한 환자에서 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산 혈증(hyperurisemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다.
이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 레보도파와 약물과 병용투여하지 않습니다.

7. 임상검사치에의 영향

- 각종 뇨검사시 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관 하십시오.
- 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 120, 240 캡슐

* 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

* 이 첨부문서의 작성일자(2009년 11월 17일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.