



최초의 trospium chloride 30mg 정제

인컨티® 30정

[염화트로스피움 30mg]

Inconti® 30 Tab.

[trospium chloride 30mg]

전문 · 수입의약품

분류번호 : 259

인컨티®30정은 trospium chloride 성분의 최초개발사인 독일 Dr. R. Pflieger사의 original 제품으로, 세계 최초의 trospium chloride 30mg 함유 정제입니다. 인컨티®30정의 주성분인 trospium chloride는 4급 암모늄으로 혈액 뇌관문을 통과하지 않으므로, 중추신경계에 대한 부작용이 없으며, 구갈 등 이상반응도 매우 적습니다. 따라서 일반 환자뿐만 아니라 치매 등 인지기능장애 및 뇌병변이 우려되는 환자에게도 투여할 수 있습니다. 또 인컨티®30정은 CYP450과의 상호작용이 없으므로, 여러 가지 약물을 병용 투여해야 하는 노인 환자에게도 용량 조절 없이 투여할 수 있습니다. 인컨티®30정은 특허 받은 특수 제형인 snap tab으로 되어있어 분할이 매우 용이합니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 분량] 1정 중 염화트로스피움(EP) 30mg

[성 상] 백색 혹은 미백색의 원형 필름코팅정

[효능 · 효과] 하부요로폐쇄에 의하지 않은 방광기능 이상에 의한 다음 질환 :

빈뇨, 야간다뇨, 과민성 방광, 절박성 요실금

[용법 · 용량] 1회 15mg(1/2정), 1일 3회 또는 아침 30mg(1정), 저녁 15mg(1/2정)을 씹지 않고 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 폐쇄각 녹내장 환자
- 2) 요폐 증상을 나타내는 배뇨곤란 환자 (전립선종 또는 비대증 환자)
- 3) 위장관의 기계적 협착 환자 (유문협착증 환자)
- 4) 부정 빈맥 환자
- 5) 근무력증 환자
- 6) 거대결장증 환자

2. 이상반응 : 항콜린작용이 나타날 수 있다.

- 1) 피부 : 발한억제, 홍반, 알러지 반응 (아나필락시스)
- 2) 눈 : 폐쇄각 녹내장, 조절이상 (특히 시력이 적절히 조절되지 않는 원시 환자)
- 3) 소화기계 : 구갈 (타액분비 억제)
- 4) 심장 : 빈맥
- 5) 비뇨기계 : 배뇨곤란

3. 일반적주의

눈의 조절이상으로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

4. 상호작용

- 1) 아만타딘, 삼환계 및 사환계 항우울약, 퀴니딘, 항히스타민제, 디소피라미드의 항콜린작용을 증강시킬 수 있다.
- 2) β -효능약의 빈맥효과를 증강시킬 수 있다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생이 보고되지 않았으나 임신중 또는 수유중 환자에게 투여 경험이 없으므로 엄격한 관리 하에서가 아니면 임신중 또는 수유중에 투여하지 않는다.

6. 과량투여시의 처치

- 1) 증상 : 지금까지 사람에게 중독의 증후는 보고되지 않았으나 시각조절장애, 빈맥, 구강건조, 피부발적 등의 항콜린작용이 나타날 수 있다.
- 2) 처치 : 부교감신경효능약인 네오스티그민으로 치료될 수 있다. 녹내장 환자에게는 필로카르핀을 국소 적용할 수 있다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 60개월

[포장단위] 100정


※ 올바른 복용법을 모르시거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.

※ 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질/부패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharmbio.co.kr)의 제품정보를 통해 확인하실 수 있습니다.

☎ 소비자상담실 : 02-587-2551(학술부)

설명서작성연월일 : 08년 9월



수입판매자
(주) 한국팜비오
본사 : 서울시 강남구 도곡동 422-2
공장 : 충북 충주시 용탄동 620-20
제조사
Dr. R. Pflieger
Chemische Fabrik GmbH
D-96045 Bamberg, Germany