

흉터 걱정 NO! 2차 감염 방지 OK!

# Derma-K<sup>+</sup>

더마케이 첩부제(푸시딘산나트륨)

일반의약품

분류번호 : 611(주) 그람양성균에 적용하는 것

## 제품의 특징

하나, 더마케이첩부제는 친수성 하이드로겔이 상처부위가 마르는 것을 방지하고 신경자극을 최소화하며 쿠션작용으로 통증을 완화하는 등 상처를 보호합니다. 딱지를 만들지 않아 흉터생성을 억제하며 딱지가 생성된 상처에도 사용이 가능합니다.  
둘, 더마케이첩부제는 생체자연치유물질인 삼출액을 잃는 것을 막아주고 적절히 흡수하며 약물을 방출하여 상처부위에 습윤환경을 조성, 유지시켜 상처치유를 촉진시키는 새로운 기술개념의 제조기술로 신기술(NET) 인증을 획득하였습니다.  
셋, 더마케이첩부제는 푸시딘산나트륨의 항균작용으로 염증 및 박테리아성 병원균에 의한 감염을 막아주고 상피세포를 생성속도를 증가시켜 치료 시간을 단축시킵니다.

- 진물, 또는 피가 나는 상처, 화상, 궤양상처, 수술상처, 찰과상, 베인 상처에 붙이면 딱지가 생성되지 않아 흉터걱정을 줄여줍니다.
- 상처를 밀폐시켜 이로운 물질을 활용할 수 있고 외부로부터 세균의 침입을 막아 상처가 훨씬 빨리 치유되고 치유되는 동안에도 아프지 않습니다.
- 하이드로겔패드가 보습환경을 유지하여 떼어낼 때 아프지 않습니다.
- 딱지가 생성된 후에 사용하더라도 딱지를 분해하고 상처를 치료합니다.  
(딱지는 수분이 없기 때문에 세포조직을 방해하고 세균에게 좋은 영양원이 되어 딱지 밑은 감염이 되기 쉽습니다.)
- 방수력이 뛰어나 상처 난 직후에 물이나 샤워가 가능하며 상처에 붙이면 눈에 잘 띄지 않습니다.

## ▶ 하이드로겔

하이드로겔은 3차원 그물망 구조의 물에 녹지 않는 물질로, 외부로부터 물질을 흡수하는 팽윤 특성을 가지고 있어, 생체조직처럼 수분이나 생체액을 다량 함유 할 수 있으며, 다른 합성 생체 물질보다 부드럽고, 생체 적합성이 뛰어납니다.

## ▶ 삼출액

상처로 인해 생기는 진물 등의 액체로 상처를 촉촉하게 유지시켜주고 상처부위에 영양공급을 용이하게 하며 박테리아를 죽여 세균감염 위험을 줄여주는 생체자연치유물질을 말합니다.

## ▶ 습윤환경

상처를 건조시키지 않고 물, 먼지, 박테리아 등으로부터 상처를 보호하여 상처의 감염을 막고 하이드로겔이 생체자연치유물질인 삼출물의 흡수 및 적절한 유지를 통해 빠른 상처회복을 돕는 환경입니다. 또한 습윤환경하에서 딱지가 생기지 않아, 상처 회복 시 흉터 걱정을 줄여줍니다.

## [원료약품 및 그 분량]

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 소형 1매 (2.1×4.2cm)중 |                      |
| 푸시딘산나트륨(항기)        | 0.47mg (역가로서 0.45mg) |
| 중형 1매 (2.5×6.5cm)중 |                      |
| 푸시딘산나트륨(항기)        | 0.70mg (역가로서 0.67mg) |
| 대형 1매 (3.6×6.5cm)중 |                      |
| 푸시딘산나트륨(항기)        | 1.81mg (역가로서 1.73mg) |

## [성상]

무색투명한 점착성물질을 부직포에 도포하고 비닐점착테이프를 고정시킨 후 박리지를 덮은 첩부제

## [효능·효과]

- 유효균종 - 포도구균
- 적응증 - 농피증(농가진, 모낭염, 종기), 화상·외상·불합창·식피창에 의한 2차 감염

## [용법·용량]

환부를 깨끗이 하고 종이를 떼어낸 후 1일 1매 환부에 직접 부착시킨다. 그 위에 적당한 거즈 또는 붕대로 고정한다.

## [사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
  - 1) 푸시딘산 및 그의 염에 과민반응의 병력이 있는 환자
  - 2) 비감수성균 (특히 녹농균)에 의한 감염 환자
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
  - 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
  - 2) 감각될 우려가 있으므로 충분히 관찰하고 감각된 증후(가려움, 발적, 종창, 구진, 소수포 등)가 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
  - 3) 반복 투여 및 장기연용으로 인해 비감수성균이 과잉증식할 수 있다. 만일 균교대종이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 4) 안전에 부착시킬 경우에는 눈에 닿지 않도록 주의한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 1) 임부 및 임신가환한 여성에게 투여 시 이 약은 전신투여 시 태반관통을 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용 시 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단 되는 경우에만 투여한다.
  - 2) 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않고 전신투여 시 유즙으로의 이행이 보고되었으나 국소사용 시 상용량에서는 유아에 영향을 미치지 않는다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첩부문서를 소지할 것. 때때로 발진, 약한 통증 및 자극 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 저장상의 주의사항
  - 1) 냉소에 보존할 것.
  - 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

## [유효기간]

제조일로부터 24개월

## [저장방법]

밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

## ▶ 사용직전에 개봉하십시오.

- ▶ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간이 경과되었거나, 변질 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ▶ 본 제품의 재경정제부 고시에 의거 소비자의 피해를 보상에 드립니다.
- ▶ 본 내용은 최신정보 및 허가 정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다.
- ▶ 작성일 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.ekdp.com](http://www.ekdp.com)), 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.
- ▶ 소비자 상담실 : >080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스)

- 작성일자 : 2007년 11월 1일
- 제조자 : (주)티티에스삼 충북 음성군 음성을 평곡리 437-6
- 제조의뢰자 : (주)광동제약 경기도 평택시 모곡동 440-2

제 조 의뢰자  **광동제약주식회사**  
경기도 평택시 모곡동 440-2  
[www.ekdp.com](http://www.ekdp.com)

K071101