

헤파피린 연질캡슐

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

"헤파피린"은 간세포 보호작용을 가진 우수하고 안전한 생약성분과 신진대사를 촉진하는 비타민B군의 복합처방으로 만성간질환, 독성물질에 의한 간질환 등으로 인한 간 손상과 신진대사의 저하를 막아주는 간장질환 치료 보조제입니다.

"헤파피린"은 간세포 보호 작용을 나타내는 카르두스마리아누스엑스(CarduusMarianus ex.)를 주성분으로 한 생약성분의 간장질환치료제입니다. 또한 복합 처방된 비타민B군은 간질환시 나타날수 있는 신진대사의 저하를 막아주어 신체기능을 활성화하고 피로물질의 배설을 도와줍니다.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(별규).....	100mg
티아민염산염(약전).....	4mg
리보플라빈(약전).....	4mg
피리독신염산염(약전).....	4mg
니코틴산아미드(약전).....	12mg
판토텐산칼슘(약전).....	8mg
시아노코발라민(약전).....	1.2μg

[성 성]

갈색의 유상액이 들어있는 진갈색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과]

다음 질환의 보조 치료 : 만성 간질환, 독성 간질환

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용한다.

치료 후 복용량을 1일 1-2캡슐로 줄인다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되어있지 않다.

2) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 설사

2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 이 약은 황색4호(파브르진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.

2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포 장 단 위] 자사포장단위

[저 장 방 법] 밀폐용기, 실온(1-30℃) 보관

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정년월일(2010.04.09)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kda.go.kr/kda2/>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

작성년월일 2010.04.09

PI1004-00

제조의뢰자

일양바이오팜

충북 제천시 왕암동933,933-1

소비자상담전화번호 080-570-3700

홈페이지 www.ilyangbiopharm.co.kr

제조자 : (주)동구제약 / 경기도 화성시 향남면 상신리 901-3