

24시간
지속효과

초기에 **확** 잡아주는 불이는 소염진통제

파워스탑 포르테 플라스타

[디클로페낙디에틸암모늄 120mg]

어깨결림

관절염

근육통

허리통증

10매입



4방향 신축성으로
부착감 우수



높은 약물 침투력

야외활동 시



등산할 때



운동전·후



파워스탑 포르테 플라스타

[디클로페낙디에틸암모늄 120mg]

어깨결림 · 관절염
허리통증 · 근육통

제품을 사용하기 전에 기재사항을 주의 깊게 읽고, 반드시 제품과 함께 보관하여 주십시오.

[제품명] 파워스탑포르테플라스타-콜타입
(디클로페낙디에틸암모늄)

[원료약품 및 그 분량] 1매(10cm x 5cm, 2g) 중
디클로페낙디에틸암모늄(BP).....120mg

[성상] 이 약은 담황색의 정형성 물질을 지지체에 도포
하고 고체면에 박리지를 덮은 첨부제이다.

[효능효과] 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염)

1) 변형성 관절염 2) 건관절(어깨관절) 주위염 3) 건(힘
줄염)·건초염(힘줄은활막염) 4) 건주위염 5) 상완골(위
팔뼈)상과염(테니스엘보우 등) 6) 외상(상처)후의 통증
(부기, 동통(통증) (타박, 좌상염), 염좌(뺨) 등) 7) 근육통
[용법용량] 환부(질환 부위)에 1일 1회 부착한다.

[사용상 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 약에 대하여 과민증의 전력이 있는 환자 2) 아스

피린 천식(비스테로이드성 소염(항
염)진통제 등에 천식 발작의 유발)
또는 그 전력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
기관지 천식 환자

3. 이상반응
1) 피부: 때때로 발적(충혈되어 붉
어짐), 발진, 가려움증, 피부건조 및
자극감 또는 드물게 종창(부기)이
나타나는 수가 있다. 이러한 증상이
심한 경우에는 사용을 중지한다. 2)
관민증: 드물게 아나필락시안 증상
(두드러기, 호흡곤란 등)이 나타나는
경우가 있으므로 이런 증상이 나타
나는 경우에는 사용을 중지한다.

4. 일반적인 주의
1) 진통소염(항염)제에 의한 치료는
원인요법이 아닌 대증요법(증상별
로 치료하는 방법)이라는 점에 유의
한다. 2) 피부의 감염증에 불특정
화(갑오) 드러나지 않게 할 우려
가 있기 때문에 감염을 수반하는
염증에 대하여 사용할 경우에는
적절한 항균제 또는 항진균제를
병용(함께) 사용하여 관리를 충분히
행하고 신중히 투여한다. 3) 만성질환
환변형성관절염 등에 대하여 이
약을 사용할 경우에는 약물요법

이외의 요법도 고려하고, 또 환자의 상태를 충분히
관찰하고 부작용의 발현(드러남)에 주의한다.

5. 임부에 대한 투여
임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않기 때문에 임
부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대하여
는 대량 또는 광범위에 걸친 장기(2)의 사용을 피한다.

6. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

7. 적용상의 주의
1) 눈 및 점막에 사용하지 않는다. 2) 표피가 결손되
어 있는 경우에 사용하면 일시적으로 피부가 저려
는 느낌이나 따끔거리는 것을 느낄 수 있으므로 사용
시 주의한다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

[제조자] 아이큐아(주)

경기도 안성시 서문면 제3공단3길 13

[제조(회)자] 경남제약(주)

충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

[소비자 상담전화] 080-232-8600

www.kyungnampharm.co.kr

[기타주의] 1. 허가된 용·효과와 다른 용도로 사용시에는
예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다. 2. 사용기한이
지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍
니다. 3. 이 약은 외용으로만 적용하시고 내복은 금하시기
바랍니다. ※ 올바른 사용법을 모르게 나 의문사항이 있는 경우
약사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
※ 만약 구입한 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태
또는 오염된 제품이 발견된 경우 공정거래위원회고시
"소비자 분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는
환불받을 수 있습니다. ※ 약약품의 용이설명 및 기타
자세한 약품 정보는 온라인의약품도서관 "http://drug.m
osgo.kr" → "의약품 검색"을 참조하시기 바랍니다.

[안전한 사용방법] ▶ 환부(질환부위)에 장시간 부착
하지 마십시오. ▶ 건조하거나 약간 피부에 부착하
신 경우 미온수로 적당히 불려서 떼어 내십시오.
▶ 피부에 이상반응(가려움증, 발진, 발적)이 나타날
경우 즉시 떼어 내십시오. ▶ 본 제품을 부착 후 샤워
나, 찜질, 목욕 등 습기 주십시오.
※ 본 제품의 잠적력은 무관하게 수분
이나 염이 많은 피부에 적용 시 쉽게 벗겨
질 수 있습니다. (적정온도 20~30℃)

OTHER



88064761010022