

효빠른 종합감기약



[원료약품 및 그분량] 1캡슐(550mg) 중

마황(KP)	200mg	반하(KP)	200mg
작약(KP)	200mg	이상 수침건조엑스	200mg
건강(KP)	40mg	아세트아미노펜(USP)	150mg
감초(KP)	120mg	염화리소짐(KPC)	10mg(역가)
육계(KP)	120mg	티페피딘하벤트산염(KP)	12.5mg
세신(KP)	120mg	클로르페니라민말레산염(BP)	1.25mg
오미자(KP)	200mg	카페인무수물(USP)	12.5mg

[성상] 암갈색의 분말이 든 상 청색, 하 백색의 불투명한 캡슐제

[효능·효과] 감기의 증상상(코물, 코막힘, 재채기, 목의 통증, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량] 성인(15세 이상) : 1회 2캡슐, 7~14세 : 1회 1캡슐
1일 3회, 식후 30분 이내에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음 사람은 복용하지 말 것.
 - 지금까지 이 약에 의한 과민증상[예를들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)]을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.
 - 난백 알레르기 환자
- 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
 - 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기증상(예를들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 유·유아 및 어린이(14세이하)
 - 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람.
 - 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자.
 - 녹내장 (예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람.
 - 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람.
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
 - 아토피피부염, 기관지천식, 약물 알레르기, 식물 알레르기 등의 알레르기성 소인이 있는 환자.
 - 양친 형제 등이 알레르기 증상의 병력이 있는 환자
 - 부종이 있는 환자
- 복용할 때 다음 사항에 주의할 것.
 - 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것.
진해거담약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
 - 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
- 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배노곤란, 현기증 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 2) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 3) 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 4) 천식이 나타나는 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 5) 바르비탈계, 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
 - 6) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.
 - 7) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 8) 장기 연용하지 말 것.
 - 9) 속 : 드물게 속이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 안면창백, 사지냉감, 혈압강하, 청색증, 의식불명 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절히 처치한다.
 - 10) 소화기계 : 설사, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 드물게 구내염 등이 나타날 수 있다.
 - 11) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상상의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
 - 12) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아이드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
6. 보관 및 취급상의 주의.
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

○경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병·의원을 통하여 교환하여 드립니다.

문서개정일 : 2008.05.27



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 논현동 430-1 ☎(02)597-1020

<http://www.i-pharm.kr>



분리배출