

생체단백칼슘제

칼스모아 정

- 갱년기 증상 완화
- 말초혈액순환
- 어깨결림, 목결림
- 신경통, 근육통
- 수족저림, 냉증
- 관절통(하리, 어깨등)

칼스모아정에 함유된 오스판올질은 뉴질랜드의 넓은 초원에서 생장대사가 왕성한 어린 송아지로부터 골유효성분을 추출한 것으로서, 종래의 무기칼슘보급제나 유기칼슘보급제와 달리 칼슘과 인의 비율(Ca:P=2:1)로 구성되어 있어 생체 이용률을 극대화하였고 아미노산과 콜라겐, 오스테오칼신등의 단백질을 함유하여 위장장애 없이 생체내 흡수가 용이합니다.

그리고, 40대 이후 중년기, 폐경기 이후의 여성, 난소를 적출한 여성, 운동량이 적은 분과, 흡연, 음주, 커피를 자주 하는 사람은 뼈의 조밀도가 떨어짐으로서 뼈의 힘이 약화되기 쉽습니다. 따라서, 칼스모아정은 중년기 여성뿐만 아니라 소화흡수가 약한 노인층의 칼슘보급에 효과적이며 청소년의 뼈 성장에도 도움을 줍니다.

또한, 칼스모아정은 항산화 성분인 토포페놀을 함유하여 혈액순환과 어깨결림, 목결림, 수족저림, 냉증등 갱년기 증상에도움을 주며, 티아민을 함유하여 신경, 근육, 관절, 허리, 어깨등의 통증을 완화하여 중년과 여성에게 더욱 효과적인 제품입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정(1250.4mg) 중

오스판올질(KPC)	415.0mg
토코페롤아세테이트50%(KPC)	200.0mg
(비타민D로서 100IU)	
셀레늄함유건조효모(KPC)	7.57mg
(셀레늄으로서 12.5μg)	
산화마그네슘(KP)	20.0mg
(마그네슘으로서 12.06mg)	
티아민질산염(KP)	15.0mg
리보플라빈부타레이트(KP)	2.0mg
에르고칼시페롤리피드(KPC)	0.118mg
(비타민D로서 100IU)	
참가제 (동물유래) : 유당수화물<기원:소, 사용부위:우유>	
참가제 (동물유래) : 오스판올질<기원:송아지, 사용부위:뼈>	

[성상] 백색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

- 뼈, 이의 발육 불량, 구루병의 예방
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림, 냉증
- 다음증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통(어깨결림) 등)
- 각기
- 칼슘 및 미세혈의 보급

[용법·용량] 12세이상 및 성인 : 1회 2정, 1일 2회 복용

[사용상의 주의사항]

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정음, 신결핵 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 1개월 미만의 영아
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피합니다.
- 4) 임부, 수유부
- 5) 심장·순환기계 기능 장애 환자
- 6) 신장에 환자
- 7) 저단백혈증 환자

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 뱀문, 식욕부진, 복부 팽만감, 저혈압, 얼굴이아름, 심박동 불규칙, 구역질, 피부발진, 종반, 부전속속(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부부종, 팍·호흡시 약취, 탈모, 조급증
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 월경전 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 월경증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨증, 물혈성 심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

5. 상호작용

- 1) 항암도스테로네, 트리헥테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용 투여하지 않습니다.
- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복통증, 복용전후에는 피하십시오.

6. 임부·수유부·미숙아·유아에 대한 투여

비타민 D는 오소분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

7. 임상검사치의 영향

요를 황색으로 변화시켜 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

[포장단위] 자사표장단위

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 만과 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드러그(ezdrug.klda.go.kr) 의약품정보를 참조하십시오.
- 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타나 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이치드러그->보고마당->안전성정보->의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- 본 제품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 사용기간이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- 본 제품에 대한 의사사항은 소비자 상담전화(02-843-1500)로 문의 하십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의사사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
- 이 첨부문서 작성일자 이후에 변경된 내용은 소비자 상담전화(02-843-1500)에서 확인 할 수 있습니다.
- 제조자 : (주)비타이오제약 경기도 아산시 부발읍 가산리 491-7

판매자 **BORYUNG**
보령제약
경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr

원료공급원 **NZP**
New Zealand Pharmaceuticals Limited
Palmerston North, NEW ZEALAND

<작성일자: 2011년 01월 11일>