

일반의약품
분류번호 490

흉터치료제

스카힐겔



이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1g 중
유효성분 : 알란토인 (USP) 10 mg
양파추출액 (1.8→1) (생규) 100 mg
헤파린나트륨 (별규) 50 I.U.
(헤파린나트륨으로서 0.4 mg) (돼지, 잠점막)
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 (KP) 1.5 mg
파라옥시벤조산프로필 (KP) 0.5 mg
기타 첨가제 : 글리세린, 부틸렌글리콜, 사과향, 잔탄검, 정제수, 카르보머940, 트롤아민, 폴리메틸렌글리콜400

【성상】
밝은 갈색의 불투명 겔제

【효능·효과】
수술, 절단, 화상, 사고 후의 비대성·켈로이드성, 운동제한성 또는 미용적 피부손상 시의 상처 및 흉터, 외상[상처]성 경축[경련과 수축이 일어나 수축상태가 지속되는 현상], 상흔성 협착[좁아짐]

스카힐겔 326 요법



매일 1일 3회



2분동안 가볍게
마사지해 주시면



6개월 후에는 오래된
흉터도 개선이 됩니다.

- 스카힐을 바른 후 **거즈나 밴드**로 덮어두시면 효과가 더욱 좋습니다.
- 상처의 혈액, 진물 등이 나오지 않을 정도로 어느 정도 상처가 아물고 난 후 발라주세요.
- 갓 생긴 상처의 경우는 **강한 마사지, 심한 온도변화, 자외선 등의 자극을 피해 주세요.**
- 처음에 따끔거림이 있을 경우 **1주일 정도 1일 1회**만 사용하여 적응기간을 가져주시는게 좋습니다.
- 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오.** 만일, 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어내고 즉시 의사의 지시를 따르십시오.



【용법·용량】

상처 부위에 충분히 침투할 때까지 하루 수회 가볍게 마사지합니다. 상처가 심하거나 오래된 상흔일 경우 고정하여 하루 저녁을 지킵니다. 갓 생긴 상처의 경우, 극도의 주위, 자외선, 강한 마사지 등 신체적 자극을 피하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 경우에는 이 약을 사용하지 마십시오.
 - 파라옥시벤조산메틸 및 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 환자
 - 임산부
 - 절개되거나 아물지 않은 상처, 점막 피부에 진물이 나는 상처부위
- 이상반응
 - 장기간 사용 후 내성이 나타날 수 있습니다.
 - 아주 드물게 국소 피부자극이 나타날 수 있습니다.
 - 국내에서 647명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과 가려움증 7건, 과민반응 1건이 보고되었습니다.
- 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 상처가 태양열이나 광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.
 - 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용하십시오.
 - 수유부의 경우는 의사·약사와 상의하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용[잘못 사용]에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10g, 20g

※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원 (1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다.
구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자(2019년 2월 26일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자

 **GC 녹십자**

(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26 TEL.031)260-9300
소비자 상담실 TEL. 080-260-0033

설명-10-2801-14