



윤게올TM3 연질캡슐

고콜레스테롤 혈증 및 말초혈행장애 개선

일반의약품

분류번호 : 218

판테친 : 간에서의 콜레스테롤 대사를 촉진하고, 혈액 중의 과도한 콜레스테롤을 제거합니다.

콩기름불검화물 : 소장에서 콜레스테롤 흡수를 억제하고 배설을 촉진합니다.

Vit.E : 항산화 작용으로 혈관장애를 줄이고 과산화지질생성을 억제하여 혈행을 좋게 합니다.

[원료약품 및 그 분량] 1 캡슐 중

판테친(JP) 62.5mg
(판테친으로서 50mg)

콩기름불검화물(KPC) 100mg
(식물스테롤로서 45.0mg, 천연토코페롤로서 20.0mg)

초산디알파토코페롤(USP) 16.67mg
(비타민 E 로서 22.67IU)

식약청인정타르색소(황색5호)(KPTaCS) 적량

[성상]

담황색의 겔상 물질을 함유한 담황적색의 타원형 연질캡슐

[용법·용량]

성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

[효능·효과]

1. 고콜레스테롤 혈증의 개선
2. 고콜레스테롤 혈증에 수반되는 말초혈행장애(수족냉증·저림)의 완화

[사용상 주의사항]

1. 다음 사람은 사용전 의사 또는 약사와 상의할 것.
의사에게 치료를 받고 있는 사람
2. 복용시 다음 사항에 주의할 것.
1) 정해진 용법, 용량을 지킬 것.
2) 고콜레스테롤혈증의 개선에는 식이요법이 중요하므로 본제를 복용 하더라도 식이요법을 병행할 것.
3. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 가려움, 발진, 발적, 식욕부진, 하리(설사), 연변, 복통, 위부불쾌감, 구역, 가슴앓이, 오심 등의 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
2) 이 약의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 많아질 수 있다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선(고콜레스테롤치의 저하)이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
4. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
3) 오용을 막고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기한] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 180, 540, 2160캡슐

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skpharma.com)나 전화(080-2008-2900)를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '이지드러그(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보'를 참조하십시오.

2008.3.15 작성

SK 케미칼 생명과학부문
경기도 안산시 단원구 목내동 474-3

기술제휴
第一三共ヘルスケア
Daiichi-Sankyo
DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD, Japan

제조원
Nissin Pharma Inc, 751 Kamishiojiri, Ueda-city, Nagano, 386-0042, Japan
(주원료의 칭량, 부원료의 칭량, 내용물의 조제, 캡슐피막의 조제, 성형, 건조 및 선별)
TOA Medicine Co., Ltd, 26, Sango, Toyama-city, Toyama-ken, 939-3548, Japan (포장)

자세한 문의로는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료) : 080-021-3131