

효과빠른 복합위장약 위콜^정

일반의약품
분류번호 : 02340

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 라니티딘염산염(KP) 31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)
산화마그네슘(KP) 50.0mg
구산알루미늄산화마그네슘(NF) 125.0mg
(Al₂O₃로서 38.31mg, MgO로서 30.13mg)
수산화알루미늄산화마그네슘(KP) 100.0mg
(Al₂O₃로서 30mg, MgO로서 30mg)
- 첨가제(타르색소) : 황색 5호, 황색203호 알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 라우릴황산나트륨, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】 황색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법·용량】

성인(15세이상, 80세 미만) 1회 2정씩 복용하되 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용합니다. 단, 1일 2회(4정)를 넘지않도록 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장(콩팥) · 간장질환, 위 · 십이지장질환, 천식 · 류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위 · 십이지장질환의 치료를 받고있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.)
 - 2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아줄게 항진균제(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위 · 십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
 - 3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상성의 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)
 - 4) 히스타민 H₂-수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람
 - 5) 소아(15세미만) 및 고령자(80세이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다), 80세 이상의 고령자(노인)에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아서 약효가 강하게 발현(드러냄)될 수 있습니다.
 - 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 하십시오.
 - 7) 투석요법을 받고 있는 환자
 - 8) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물상호작용에 의해 부작용의 발현(드러냄) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
 - 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
 - 3) 고령자(노인)(65세이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.
 - 4) 인후(목구멍)통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소등의 혈액이상성이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 본제(이 약)의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
 - 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
 - 6) 복통(배앓음)이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
 - 7) 이 약은 황색 5호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러냄)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 2) 이 약의 복용후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 소맥힘 등이 나타나는 경우
- 3) 고열을 동반한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 4) 목의 통증, 발열, 컨태감, 얼굴과 눈거품의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(치경(잇몸)의 출혈, 비출혈(코피) 등)이 나타나는 경우
- 5) 황달
4. 일반적인 주의
 - 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 2) 2주간을 초과하여 연용(계속 복용)하지 마십시오.
 - 3) 이 약을 복용할시에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜농도를 높일 수 있음)
 - 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 5) 기재된 효능이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
 - 6) 장기연용(계속 복용)을 하지 마십시오.
 - 7) 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 상호작용
 - 1) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
 - 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)
 - 뉴-퀴놀론계 항균제(오픈록사신 등)
 - 2) 이 약을 다른 위장약과 병용(함께사용)하지 마십시오 : 다른 위장약을 동시에 병용(함께사용)하면 작용이 강하게 발현(드러냄)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
7. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)
8. 고령자(노인)에 대한 투여(65세이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.
9. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선이나 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20정(10정/PTPX2)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) → (의약품검색)을 참조하십시오.

WCT01-E01-04

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 08. 21

제조사 : JS제이에스제약(주)

전남 장성군 황룡면 광변로 484-28
소미자성업전화 : 061394-5530

판매자 : 태극제약(주)

강도 화성시 남양읍 제약로33길 123