

일반의약품

분류번호 : 비타민B 제 (03120)

- ※ 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

포스톤 정
POSTONE®



체력저하 / 피로회복 / 눈의피로 / 근육통

[원료약품의 분량] 1정 중

- 푸르셀티아민염산염 (KP) 50.0mg
 - 마늘엑스 (100~1) (생구) 50.0mg
 - 토코페롤아세테이트 2배산 (KP) 50.0mg
(비타민 E로서 25IU)
 - 리보플라빈 (KP) 5.0mg
 - 피리독살포스페이트수화물 (KP) 5.0mg
 - 히드록스코발라민아세테산염 (KP) 10.0μg
- 동물유래성분 : 무수유당(소, 우유)
첨가제(타르색소) : 황색203호, 적색3호, 적색40호

[성 상] 적색의 타원형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆의 보급
 - 육체피로, 임신, 수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통 (요통, 건통(개골결림) 등) ●각기 ●눈의 피로

[용법·용량]

8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 2회 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 (젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음환자에게는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부, 수유부
3. 부작용
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨리 지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속 될 수도 있다.

- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용한다.
5. 상호작용
 - 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 사용)투여하지 않는다.
 - 레보도파
6. 임상검사치에의 영향
 - 1) 요를 황색으로 변화하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장 방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[포장 단위] 자사포장단위

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 : 02-2206-3800 에서 확인 할 수 있음.
- ※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고 의약품용어설명 및 정보는 "온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조"