

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	300.00mg
티아민질산염(KP)	12.50mg
토코페롤아세테이트(KP)	50.00mg
니코틴산아미드(KP)	10.00mg
피리독신염산염(KP)	25.00mg
판토텐산칼슘(KP)	15.00mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6.00mg
감마오리자놀(KPC)	5.00mg
시아노코발라민(KP)	30.00 μ g
이노시톨(KP)	15.00mg
청색1호, 적색40호, 황색5호(KPTaCS)	적량

【성상】 황색의 내용물이 든 적색의 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후의 체력저하
 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어께·목결림, 수족저림, 수족냉증
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등) 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
 - 각기, 눈의 피로

【용법·용량】 8세 이상 어린이 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐을 식후복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3 개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부, 수유부
3. 이상반응
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적
 - 구역, 식욕부진, 복부팽만감, 구토, 묽은변
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 5) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
 - 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 상호작용

이 약을 투여할 경우 레보도파의 약물과 병용투여하지 않는다.
6. 임·검사치에의 영향

요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위



한국웨일즈제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4
소비자상담실: 031)494-5995

*본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

*이 첨부문서 작성일자(WA080703) 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수
있습니다.