



60캡슐

황산콘드로이틴나트륨 300mg 함유

벅스콘

연질
캡슐

어깨 · 목결림
관절통 | 수족저림
신경통 | 육체피로
근육통 | 눈의 피로



광동제약(주)

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 3개월 미만의 영아
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부, 수유부
3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는
지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 이상반응
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사
또는 약사와 상의할 것: 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은
변, 구내염, 식욕 부진, 복부 팽만감 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보
다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다. 3)
에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있
는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 피리독
신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적
증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있
다. 5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10ug이상 투여할 경우 혈액학
적 반응이 나타날 수 있다. 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고
당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능
력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상
태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 일반적 주의
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이
없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 3) 어린이에게 투여할 경우에는
보호자의 지도 · 감독하에 투여한다. 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는
환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을
통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절
히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약중
의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감
소해야 한다.
- 상호 작용
이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용 투여하지 않는다. 1) 레보도파
- 임상검사치에의 영향
요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있
으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다. 3) 오용을 피하고, 품질을
보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.



일반의약품

분류번호:03160

60캡슐

황산콘드로이틴나트륨 300mg 함유

벅스콘

연질
캡슐

어깨 · 목결림
관절통 | 수족저림
신경통 | 육체피로
근육통 | 눈의 피로



광동제약(주)

【성분 · 함량】 1캡슐 중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	300mg
푸르셀티아민(KPC)	15mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
니코틴산아미드(KP)	10mg
판토텐산칼슘(KP)	10mg
피리독신염산염(KP)	10mg
시아노코발라민(KP)	30ug
토코페롤아세테이트(KP)	50mg
(비타민E로서 50IU)	
감마오리자놀(KPC)	5mg
첨가제(타르색소): 적색40호, 황색5호	

【성 상】 황색의 내용물이 충전된 주황색의 정방형 연질캡슐

【용법 · 용량】 성인 및 8세 이상의 어린이: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【효능 · 효과】

- 다음 경우의 비타민(E, B₁, B₂, B₆)의 보급:
육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨 · 목결림, 수족저림, 수족냉증
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염, 구순염,
구내염, 설염, 습진, 피부염
- 각기 - 눈의 피로

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60, 120캡슐

【판매자】 광동제약(주) 경기도 평택시 모곡동 440-2

【제조/의뢰자】 (주)넥스팜코리아 충북 진천군 문백면 장월리 112-3

【제조사】 (주)통구제약 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중
변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여
드립니다. 제품에 관한 문의는 전화(02)3473-6365로 하시기 바랍니다.

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) -
「정보마당」 - 「의약품등 정보」를 참조하세요.

개정연월일: 2010년 1월 22일

제조번호: 11001

사용기한: 2014.03.28

