

【사용상의 주의사항】

- 1.경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 아이라도 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 2.다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약 또는 파노치아진계 약물에 과민증 환자
2) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등을 일으킨 적이 있는 사람
3) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 3.다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 일례르성 비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
2) 약으로 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 가려움 등을 일으킨 일이 있는 환자
3) 간장애, 신장애, 감상성 질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고혈압자, 허약자
4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 4.부작용
1) 이 약을 투여하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
2) 이 약을 투여하는 동안 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

- 3) 다른 항히스타민제와 같이 쇼야에서 과잉흥분을 일으킬 수 있다.
- 4) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

【용법·용량】

성인 1회 1~2캡셀 1일 2~3회 복용한다.
아래와 기침이 심한 환자는 용량을 증가시킬 수 있다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 · 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【판매원】 (주)제일약품 / 서울시 서초구 빈포동 745-5

【제조자】 한국코이제약주) / 경기도 연천군 연천읍 음내리 236

【소비자 상담실】 080-777-3355

제조번호 : 0801

사용기한 : 2011.12.28



【원료약품 및 분량】 1캡셀(47mg) 중

구아니페딘신 (KP)	33.3mg
벤조산나트륨 (KP)	33.3mg
염산옥소메마진 (KPC)	1.83mg
아세트아미노펜(KP)	33.3mg

【효능·효과】

기침, 가래, 천식

【성상】

흰색 분말이 든 상부 진한 녹색, 하부 흰색의 경질 캡슐제

KGMP

적격업체제품

일반의약품

분류번호 : 222

기침 · 가래

10캡셀

기침 · 가래
코아코프 캡슐



제일약품

기침 · 가래 코아코프 캡슐



제일약품 주식회사

서울특별시 서초구 빈포동 745-5