

비호르몬성 생약성분의 폐경기 장애 개선제

에로민정

일반의약품

분류번호: 117

EROMIN Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

히페리시80%메탄올건조엑스(KPC) 84mg

승마추출액(KPC) 0.0364mL

※ 식약청인정 타르색소(황색 203호, 청색 1호, 황색 5호)

【성 상】 어두운 녹색의 원형 필름코팅정

【약리 작용 및 특징】

1. 에로민정은 식물성 신경안정제인 히페리신 성분과 식물에서 추출한 에스트로겐 유사물질인 승마추출액의 복합제로서 두 성분의 상승작용으로, 폐경기에 나타나는 육체적 증상 및 정신적 증상을 효과적으로 치료합니다. 특히 황체자극호르몬 분비를 직접적으로 차단하기 때문에 발한, 홍조, 우울 등의 증상을 원인으로 차단해 줍니다.
2. 에로민정은 생약 추출물질로서, 국내외 임상실험결과 부작용이 경미하여 폐경 여성의 삶의 질을 효과적으로 향상시켜 줍니다. 또한 기존 호르몬요법에서 나타나는 질 출혈, 체중증가, 유방통 등의 부작용이 거의 없어 장기간의 치료를 요하는 폐경 증상 치료에 적합합니다.
3. 에로민정은 기존 호르몬요법과 달리 유방조직이나 자궁내막에 대해서는 자극효과를 나타내지 않아 일반 폐경 여성은 물론 호르몬제 금기 환자도 안심하고 복용할 수 있습니다.
4. 에로민정은 난소 적출술이나 자궁 적출술, 기타 여성 호르몬 이상에 기인되는 체반 증세를 지닌 여성에게 적용 가능하며, 호르몬 실조 증상을 보이는 젊은 여성에게까지 광범위하게 적용될 수 있습니다. 특히 폐경기 환자의 경우에는 여타의 에스트로겐 복용환자에게서 나타나는 생리유도 현상이 나타나지 않기 때문에 환자의 순응도가 더욱 높은 제제입니다.
5. 에로민정은 복용하기 편리하고, 체내에서 빨리 흡수가 되도록 제제화시킨 제품입니다.

【효능 · 효과】

폐경기의 다음 증상

- 홍조, 발한, 의욕저하
- 의기소침, 정신적긴장, 신경과민, 집중력부족, 불면, 불안 또는 불쾌함 등의 자율신경장애
- 생리전의 불수의적(psychovegetative) 이상증상

【용법 · 용량】

1회 1정씩 1일 2회, 필요시 1회 2정씩 1일 2회 복용합니다.

아침, 저녁 씹지 않고 물과 함께 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이약의 성분에 과민한 환자
- 2) 기지의 피부 광과민성 환자
- 3) 임부 및 수유부(사용경험이 충분하지 않습니다)

2. 이상반응

- 1) 햇볕에 대한 피부의 민감성이 증가하는 광과민 반응이 특히, 피부가 흰 사람에게서 유발될 가능성이 있습니다.
- 2) 간독성 이상반응이 보고된 바 있으며, 간질환으로 의심되는 증상이 나타날 수 있습니다.
- 3) 드물게 피로, 불안, 위장관 장애가 나타날 수 있습니다.

3. 일반적인 주의

- 1) 이약을 투여하는 중에 간질환으로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위의 통증, 진한 노 등)이 나타날 때에는 이 약의 복용을 중단하고 즉시 의사와 상담하여야 합니다.
- 2) 이전에 간질환 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위험이 있었던 환자는 의사와의 상담 후에 복용하여야 합니다.

4. 상호작용

이 약은 사이토크롬 P450 대사효소를 유도하므로, 이 효소에 의해 대사되는 다음 의약품의 혈중 농도를 감소시킬 수 있습니다. 따라서 다음 의약품과의 병용은 가능하면 피하고 부득이 하게 병용 시에는 부작용 발현 여부 및 아래 사항에 주의해야 합니다.

- 1) HIV 프로테아제 저해제(인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 암프레나비르 등)등 항레트로바이러스제(에파비렌츠, 네비라핀, 데라비르딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 다디노신, 잘시타빈 등)과 병용시 이러한 항레트로바이러스제의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현될 수 있습니다.
- 2) 쿠마린계 항응고제(펜프로쿰온, 와파린 등), 면역억제제(사이클로스포린, 타크롤리무스 수화물 등), 강심제(디기톡신, 디곡신, 메칠디곡신 등), 기관지 확장제(아미노필린, 콜린 테오필린, 테오필린 등), 항부정맥제(아미오다론, 퀴니딘, 디소피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항건련제(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 등), 항우울제(이미프라민, 아미트립틸린, 노르트립틸린 등), 항암제(사이클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에토포시드 등)과 병용시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요합니다.
- 3) 경구용 피임제(에치닐에스트라디올, 데소게스트렐, 노르에치스테론, 레보노르게스르렐 등)와 병용시 경구용 피임제의 효능 감소 및 부정성기출혈의 발현율이 증가할 수 있습니다.
- 4) 선택적세로토닌재흡수저해제 등 관련 항우울약(시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 세르트랄린, 네파조돈 등), 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 줄미트립탄 등)와 병용시 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있습니다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
임부 및 수유부 투여에 관한 자료는 충분하지 않습니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관 하십시오.
 - 3) 오용을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장단위】 120정, 240정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 외부 포장에 표기

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자 『○○△△□□』로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
 - * 이 첨부문서 작성일자(2009년 02월 27일)이후 변경된 내용은 소비자상담실(02-834-2607)에서 확인할 수 있습니다.
 - * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요.
 - * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- 제 조 원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 신정리 521-15
- ☞ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

문안작성년월일 : 2009년 02월 27일

제조의뢰 · 판매원

 **유한메디카**

충북 청원군 오창읍 양침리 807-1

- 대표전화 : 02-834-2605~6
- 소비자상담전화 : 02-834-2607
- 홈페이지주소 : www.yuhanmedica.co.kr