

1일 1정 복용

비타민, 미네랄 종합영양제

메가제텐정

[원료약품 및 그 분량] 1정(1330mg) 중

토코페롤아세테이트 50%(KPC) (비타민E로서 30IU).....	60mg
적티용아스코르빈산(벨귀)(아스코르빈산으로서 630mg).....	650mg
폴산(KP).....	0.4mg
티아민질산염(KP).....	25mg
리보플라빈(KP).....	12mg
니코틴아마이드(KP).....	100mg
피리독신염산염(KP).....	10mg
시아노코발라민(KP).....	0.012mg
판토텐산 칼슘(KP).....	30mg
황산이연(USP)(아연으로서 23.9mg).....	65.6mg
셀레늄 함유 건조효소(KPC)(셀레늄으로서 20μg).....	37mg

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정**[효능·효과]**

- 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중 - 병후의 체력저하 시 - 노년기
- 이 약에 포함된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
 - 각기 - 눈의피로
 - 아연의 보급

[용법·용량] 성인 1회 1정, 1일 1회 복용**[저장방법]** 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준)적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리 받을 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드려요. 공정거래위원회고 소비자분쟁해결기준에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭-보고마당-안전성정보-의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

[제조사] 한국코아제약(주) 경기도 연천군 연천읍 읍내리 236

판매자
보령제약

경기도 안산시 단원구 신갈동 112-2
www.boryung.co.kr

보령제약

1일 1정 복용

비타민, 미네랄 종합영양제

메가제텐정

셀레늄

비타민C

아연

- 육체피로 · 체력저하
- 임신수유기 · 발육기
- 노년기 · 신경통
- 관절통 · 눈의피로

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 1세 미만의 영아
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 과수신노환자(hypercalcaemia : 노중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 4) 일부 수유부
 - 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장장애 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
 - 8) 위장장애 질환
- 부작용
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 위부불쾌감, 설사, 빈배, 발진, 질염, 구역, 구토, 설사, 붉은 변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감, 피부염, 등·호흡기 질환, 탈모, 조골증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 지혈장애, 때때로
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 약이 걸림 같을 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 예스트로젠을 포함한 경구용 피임제용 복용하는 여성 또는 완전한 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 칼슘증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 피리독신을 1일 500~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화에 나타날 수 있다).
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 100~200μg 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisaemia, 혈액중에 요산이 과량으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 출혈성상부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 일반적주의
 - 1) 정확히 용법·용량을 잘 지킨다
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 상호작용
 - 1) 항암도제나 항응고제, 트리아진과 병용투여시 고칼혈증 등을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - 가) 인산염, 갈슘염, 경구용트리아진과 병용투여 시, 개산제 나 리튬도라
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것
- 임상검사항에 영향
 - 1) 각종 요검사에 혈액의 검출을 방해할 수 있다.
 - 2) 요를 황색으로 변화시켜 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 적사정신을 피하고 덜 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관한다.
 - 3) 외·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

8 8067 19 0055 18

보령제약