

잇몸질환 치료제

유덴티

■ 성분 · 함량 1캡슐 중

염화리소집(KPC).....	30mg
제피아스코르빈산96%TypeSC(별규).....	156.25mg
(아스코르빈산으로서 150mg)	
건조초산토코페롤50%TypeSD(별규).....	60mg
(초산토코페롤로서 30IU)	
동글로로필린나트륨(KPC).....	20mg

■ 효능 · 효과

치은염(잇몸염) · 치조(이들)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐) · 부기 · 출혈 · 고름 등)의 완화

■ 성상

회백색 분말과 흑청색 입상(알갱이모양)들을 함유하는 암녹색 경질캡슐제

■ 용법 · 용량

성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용한다.

■ 사용상 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 난백 알레르기 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 아토피피부염, 기관지천식, 약물 알레르기, 식물 알레르기 등의 알레르기성 소인이 있는 환자.
- 2) 양친 형제 등이 알레르기 증상의 병력이 있는 환자.
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들어 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)의 병력이 있는 사람.

3. 부작용

- 1) 속 : 드물게 속이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면(얼굴)창백, 사지냉감(팔다리 찬느낌), 혈압강하, 청색증, 의식불명 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절히 처치한다.
- 2) 과민증 : 때때로 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 소화기계 : 설사, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 드물게 구내염(입안염) 등이 나타날 수 있다.
- 4) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염(입안염)등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상상의 수종 등의 중증(심한증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

■ 저장방법

차광한기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 자사포장단위

■ 사용기간 제2일로부터 36개월

■ 소비자상담실 080-700-8487

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 이지드렉(<http://ezdrug.kda.go.kr/kda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자 : 2010. 10

■ 판매원



충남 천안시 서북구 성가을 오백당리 15-20

■ 제조자



전북 완주군 봉동읍 둔산리 865-1,2